

Bs. Lê Nhật Nam –

I.Định Nghĩa:

Bệnh thuốc điều trị bệnh chàm bội nhiễm (AIOD) là một bệnh thường gặp ở bệnh nhân nhiễm khuẩn ngoài da, biểu hiện bằng triệu chứng máu cục bộ ở chi dưới và/hoặc các mô và cơ quan vùng chậu do hộp thuốc điều trị bệnh chàm bội nhiễm bên dưới nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn chậu. Đau cách hời là biểu hiện lâm sàng phổ biến nhất và có thể gây triệu chứng máu cục bộ trầm trọng ở chi dưới nếu bệnh tiếp tục nặng hơn. Do đó, điều trị thích hợp là cần thiết để ngăn chặn sự duy trì sự nhiễm khuẩn cơ thể máu và cải thiện các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân AIOD.

Tỷ lệ mắc bệnh thuốc điều trị bệnh chàm bội nhiễm (AIOD) và bệnh nhiễm khuẩn ngoài da biên nói chung rất khó xác định vì nhiều bệnh nhân không có triệu chứng. Các ước tính đã dao động từ 3,56% đến hơn 14% đối với dân số nói chung. Nhiều nghiên cứu chứng minh tỷ lệ mắc bệnh gia tăng ở nhóm dân số lớn tuổi, ước tính 14% -20% trên 70 tuổi và 23% trên 80 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở nam giới và quần thể người da đen không phải gốc Tây Ban Nha, cũng như những người bị bệnh hệ thống bệnh các yếu tố rủi ro nêu trên. Nguyên nhân thường gặp là xơ vữa động mạch, viêm xơ hóa và bệnh Takayasu. Đa số bệnh nhân tiếp tục khám vì các dấu hiệu triệu chứng máu nuôi mô tính 2 chân.

Các yếu tố nguy cơ có liên quan nhiều đến bệnh, chứng bệnh như: có đến 90% những bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc và gần 60% vẫn đang hút thuốc vào thời điểm phát hiện bệnh. Đái tháo đường, tăng huyết áp cao, rối loạn lipid máu, bệnh mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và suy thận mãn, tình trạng tăng Homocystein máu, tính chất gia đình những người bệnh nhân này. Những bệnh nhân trẻ hơn (<50 tuổi) bị triệu chứng máu cục bộ chi dưới cần tiếp tục được phát hiện là có tỷ lệ mắc các tình trạng tăng đông máu gia tăng.



[Xem tiếp tại đây](#)

