

Bs Nguy*o*n Minh Tú -*o*

Vi*o*c tr*o*ng l*o*i thành công các ngón tay b*o* c*o*t c*o*t không ch*o* đ*o*a trên k*o* thu*o*t vì ph*o*u, mà c*o* các lo*o*i thu*o*c đ*o*c s*o* đ*o*ng sau ph*o*u thu*o*t. Ba lo*o*i thu*o*c th*o*ng đ*o*c s*o* đ*o*ng sau khi ph*o*u thu*o*t, đó là thu*o*c kháng sinh, thu*o*c ch*o*ng co th*o*t và thu*o*c ch*o*ng đông máu. Thu*o*c kháng sinh ph*o*i đ*o*c s*o* đ*o*ng trong ph*o*u thu*o*t và sau ph*o*u thu*o*t vì ch*o*n th*o*ng ph*o*c t*o*p, th*o*i gian dài và ti*o*p xúc v*o*i v*o*t th*o*ng kéo dài. Nh*o*ng lý do ph*o* bi*o*n t*o*i sao thu*o*c ch*o*ng co th*o*t và thu*o*c ch*o*ng đông máu nên đ*o*c s*o* đ*o*ng sau khi ph*o*u thu*o*t là:

1. Kh*o* năng đông máu tăng sau ch*o*n th*o*ng và ho*o*t đ*o*ng, đó là b*o*o v*o* c*o*a c*o* th*o* ph*o*n n*o*ng sinh lý
2. Adrenaline đ*o*c ti*o*t ra sau ch*o*n th*o*ng và ho*o*t đ*o*ng; do đó, b*o*nh nhân đ*o* b*o* co th*o*t m*o*ch, tăng ti*o*u c*o*u và s*o* gia tăng đông máu, đ*o* dàng đ*o*n đ*o*n huy*o*t kh*o*i
3. Co c*o*ng và huy*o*t kh*o*i có th*o* đ*o* dàng gây ra b*o*i vì đ*o*ng kính nh*o*, mà th*o*ng là 1–3 mm (t*o*i thi*o*u là 0,2–0,5 mm) và đ*o* b*o* nh h*o*ng b*o*i các y*o*u t*o* hóa lý
4. Có nguy c*o* huy*o*t kh*o*i cao h*o*n do l*o*c c*o* xát nh*o* đ*o*i v*o*i l*o* thông n*o*i gây ra b*o*i đ*o*ng kính nh*o* và l*o*u l*o*ng máu th*o*p. C*o*n s*o* đ*o*ng thu*o*c ch*o*ng co th*o*t và thu*o*c ch*o*ng đông máu vì các thí nghi*o*m đã ch*o*ng minh r*o*ng đ*o*ng kính c*o*a m*o*ch càng nh*o* thì càng có nhi*o*u kh*o* năng huy*o*t kh*o*i s*o* x*o*y ra, vì m*o*ch 1 mm có m*o*t đ*o* h*o*p th*o* ti*o*u c*o*u cao g*o*p đôi so v*o*i m*o*ch 2 mm. Trong B*o*ng 4.1, các lo*o*i thu*o*c th*o*ng đ*o*c s*o* đ*o*ng đ*o*c hi*o*n th*o*.

Đ*o*c đ*o*i m, ch*o* đ*o*nh, ph*o*n n*o*ng b*o*t l*o*i và bi*o*n pháp phòng ng*o*a đ*o*i v*o*i các lo*o*i thu*o*c này đ*o*c mô t*o* nh*o* sau.

B*o*ng 4.1 Các thu*o*c th*o*ng dùng

Các lo ngại thu hẹp thính lực dùng sau khi nếm i-lời ngón tay đọt lia

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 13 Tháng 9 2023 14:12 -

Thuốc kháng sinh	Penicillin, cephalosporin, macrolide, v.v., dùng riêng lẻ hoặc kết hợp
Thuốc chống đông	dextran 6% 40 iv nhỏ giọt (500–1000 ml/ngày); hoặc aspirin (3 lần/ngày, mỗi lần 0,5–1 g); hoặc tiêm glucose 5% 1000 ml + heparin thấp phân tử 1500 IU (đối với trẻ em: 11–150 U/kg + tiêm glucose 5% 500 ml), duy trì trong 24 giờ
Thuốc chống co thắt	Benzazoline 25 mg hoặc papaverine 30 mg/6–8 giờ, tiêm bắp, dùng đơn độc hoặc phối hợp

[illegible]