

Giảm tỉ lệ tử vong do suy tim do truyền máu khi lọc máu

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 22:21 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 07:40

Truyền máu khi lọc máu (TMKLL) là truyền máu hơn hoặc bằng 3000ml máu và chế phẩm máu trong vòng 24 giờ cho cùng một người bệnh. Đây là một phương pháp điều trị hiệu quả trong những trường hợp mất máu cấp hay các phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Tuy nhiên, máu lưu trữ thời gian hay thiêu hủy tất cả yếu tố đông máu và chế biến các chất hoá học trung gian và các enzyme (giải phóng ra trong quá trình bảo quản và lưu trữ máu) nên khi truyền cho người bệnh với số lượng nhiều chế biến sẽ gây ra những rối loạn đông cầm máu. Giảm số lượng tử vong do suy tim do cũng là một trong những biện pháp đang được nghiên cứu do truyền máu khi lọc máu.



Giảm số lượng tử vong do suy tim do sau truyền máu khi lọc máu do máu lưu trữ không còn tử vong, do hòa loãng máu hay do chế biến thiếu hụt dinh dưỡng.

Nghiên cứu trên 30 người bệnh (13 nam và 17 nữ) truyền máu khi lọc máu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam từ tháng 10/2010 đến tháng 09/2012, chúng tôi nhận thấy số lượng tử vong

Giảm tỉ lệ tử vong máu ngoại vi do truy cập máu khi lập ngân hàng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 22:21 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 07:40

Cửu giảm khác biệt ($p < 0,01$) ở cả hai thời điểm T1 (Ngày sau TMKLL) và T2 (24h sau TMKLL) so với thời điểm T0 trước truy cập máu. Một nghiên cứu của Nguyễn Thị Huệ và Đ. Trung Ph. n năm 2008 cũng cho kết quả tương tự.

Điều trị giảm tỉ lệ tử vong máu ngoại vi do truy cập máu khi lập ngân hàng chủ yếu dựa trên máu t. ở toàn phần, chỉ phẩm này vừa bổ sung tỉ lệ tử vong và các yếu tố đông máu, vừa hạn chế được tình trạng giảm tỉ lệ tử vong do hòa loãng máu; do đó, hạn chế các rủi ro liên quan đông ch. y máu nói chung và các tai biến của nó.

ThS. BS. Phạm Thị Vĩnh