

Bs Trần Thị Minh Thanh - Khoa Nhi TH

1. Giới thiệu:

Bệnh nhiễm huyết kết tràng là sự lắng đọng của các kết quặng là một màu nâu đen đặc trưng cho sự đổi màu đen của lớp niêm mạc ruột già. Sự đổi màu có thể nhẹ hoặc rất rõ rệt, màu nâu đen của niêm mạc ruột có thể được thấy ngay khi nội soi trực tràng hoặc qua da. Các quặng và mô hình của sự đổi màu thường có thể khác nhau giữa các vị trí khác nhau trong đường tiêu hóa của bệnh nhân.

2. Nguyên nhân:

Bệnh nhiễm huyết kết tràng là một tình trạng thường liên quan đến sự đóng thu các nhu mô trong ruột già. Các thu các nhu mô trong ruột già đi qua đường tiêu hóa không được hấp thu cho đến khi chúng đến ruột già, nơi đây chúng được thay đổi thành các hình thức hoạt động, các hợp chất hoạt động đến đến gây tổn thương cho các tế bào trong lớp niêm mạc ruột và đến đến quá trình apoptosis (sự tự hủy diệt, một dạng tế bào chết). Khi đó các tế bào đã bị hủy hoại, các sản phẩm được trưng bày thành ruột phát triển. Điều kiện có thể phát triển thành bệnh nhiễm huyết kết tràng chỉ sau một vài tháng sự đóng thu các nhu mô trong ruột già.

3. Triệu chứng:

Bệnh nhiễm huyết kết tràng có triệu chứng như bụng trướng, táo bón và khó đi đại tiện, một số bệnh nhân bị đau bụng và ăn không ngon, đa số bệnh nhân không có triệu chứng. Bình thường bệnh nhiễm huyết kết tràng như hình ảnh dưới đây là một đám rối trên bề mặt ruột và có liên quan đến việc làm thoái hóa các dây thần kinh trong niêm mạc. Bệnh nhiễm huyết kết tràng có một mối liên quan nhất định đến rối loạn chức năng phân.

4. Chẩn đoán:

Bệnh nhiễm huyết kết tràng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 20 Tháng 6 2013 08:40 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 20 Tháng 6 2013 08:52

Bệnh nhiễm huyết kết tràng chẩn đoán dựa vào hình ảnh nội soi kết tràng và sinh thiết làm gì ở phụ nữ?


5. Điều trị:


Không có điều trị đặc hiệu, ngừng sử dụng thuốc nhuận tràng anthranoid. Phòng bệnh nhiễm huyết kết tràng là khi bệnh nhân bỏ táo bón khuyến khích bệnh nhân thay đổi chế độ ăn, ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước, vận động, tránh lạm dụng thuốc nhuận tràng anthranoid

6. Tiên lượng:

Nếu mất ngủ, ngừng sử dụng thuốc nhuận tràng anthranoid, bệnh nhiễm huyết kết tràng giảm bớt theo thời gian và có thể biến mất trong vòng 1 năm. Nghiên cứu ban đầu cho rằng các thuốc nhuận tràng anthranoid có thể có các hoạt động gây ung thư hoặc khác, và sự hiện diện của bệnh nhiễm huyết kết tràng có thể báo hiệu mức độ gia tăng cho sự phát triển của bệnh ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, gần đây theo dõi nghiên cứu đã không cho thấy mối liên quan giữa ung thư ruột kết và sử dụng thuốc nhuận tràng anthranoid hoặc giữa ung thư ruột kết và phát hiện bệnh nhiễm huyết kết tràng

Hình ảnh nội soi bệnh nhiễm huyết kết tràng





Colorectal polyps (2012), Melanosis Coli, International e Journal of Science Medicine & Technology (2012)