

Dịch truyền tĩnh mạch

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 20 Tháng 6 2013 22:06 -

Ths Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng Khoa CĐYT Quận Nam

Mở Đầu

Dịch truyền là danh từ chung dùng để chỉ các dung dịch thể (dung dịch, nhũ dịch) có dung tích lớn, thường dùng để đưa vào tĩnh mạch. Có nhiều loại như 2 loại thông dụng là:

- Loại dùng để pha trộn tích dịch lớn hành khi bổ máu, bổ năng, tái huyết áp,...
- Loại cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân ốm yếu.



Trong thực hành lâm sàng hàng ngày hiện nay, nhu cầu chuyển dịch tĩnh mạch ngày càng rộng rãi và nhu cầu thay thế các sản phẩm ghi nhận một số kiến thức cần bổn và các loại dịch truyền để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Vấn đề này không phải là đáng ngại không phải là quá khó khăn để thực hiện được. Sau đây là một số kiến thức cần bổn và dịch truyền tĩnh mạch:

I. CÁC DUNG DỊCH BÙ DỊCH

Khi lưu lượng dịch theo lưu hành trong lòng mạch không đủ sẽ dẫn đến hạ huyết áp và quá trình vận chuyển oxy đến mô bị ngừng trệ. Quyết định chọn loại dịch truyền nào phải căn cứ vào sự thay đổi huyết động. Có thể chọn dung dịch đẳng trương, dung dịch keo để giữ cân bằng áp suất thẩm thấu và áp lực keo cho máu.

Chú ý: các dung dịch chứa glucose nên dùng không được với mục đích này vì glucose phân tán theo do trong các khu vực ngoại bào của thể mô và ngoại bào, đi qua thành mạch dễ dàng nên không giữ được lâu trong lòng mạch.

Có hai loại hay dùng:

- Dung dịch chứa muối khoáng (còn gọi là dung dịch tinh thể).
- Dung dịch keo (tự nhiên và nhân tạo).

[Mời các bạn xem tiếp tại đây](#)