

Sử dụng Warfarin đúng mức ở bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ

Viết bởi Biên tập viên

Thật, 17 Tháng 7 2013 12:41 - Lần cập nhật cuối: Thật, 17 Tháng 7 2013 12:58

Ths Lê Thị Đình - Khoa ICU

Theo một nghiên cứu gần đây, việc sử dụng warfarin, một thuốc chống đông máu để ngăn ngừa đột quỵ ở bệnh nhân nhồi máu não với chống rung nhĩ vẫn còn dè dặt vì lo ngại.

"Chúng tôi phát hiện 73 trong số 119 bệnh nhân có nguy cơ cao bị đột quỵ không đào thải warfarin", trưởng nhóm nghiên cứu, BS Lim Toon Wei, giám đốc đơn vị chăm sóc mạch vành, Trung tâm Tim mạch Đại học Quốc gia Singapore cho biết. "Chảy máu là lý do số 1 để thay thuốc không dùng thuốc chống đông cho bệnh nhân."

Các nghiên cứu hội tụ bao gồm 1.826 bệnh nhân nhồi máu não từ đơn vị tim mạch của Bệnh viện Đại học Quốc gia từ tháng 1 đến tháng 3.2010. Trong số bệnh nhân này, có 163 bệnh nhân rung nhĩ không có bệnh lý van tim và 119 bệnh nhân là có nguy cơ cao bị đột quỵ. Gần 60 % là nam giới. Tuổi trung bình là 69 tuổi.

Nhóm bệnh nhân lớn tuổi và nhóm ngấm có tỉ lệ số chảy máu hiếm khi được dùng warfarin. Trong số bệnh nhân đang dùng warfarin, 40,7 % không nằm trong giới hạn điều trị chống đông, khiến họ tăng nguy cơ huyết khối. Gần 19% nằm trong giới hạn điều trị chống đông, cho thấy tăng nguy cơ chảy máu.

Sử dụng Warfarin đúng mức để bệnh nhân có nguy cơ đột quỵ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 17 Tháng 7 2013 12:41 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 17 Tháng 7 2013 12:58

