

Bs Trần Văn Thành và Cs

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi của phẫu thuật nội soi sau phúc mạc để xử lý sỏi niệu quản và cắt chèn nang thận dưới gây tê tê y sng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2012, có 7 bệnh nhân đi mổ sỏi ASA I hoặc II được mổ nội soi sau phúc mạc để xử lý sỏi niệu quản và cắt chèn nang thận dưới gây tê tê y sng tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Kết quả: Tất cả các trường hợp đều thực hiện thành công bệnh nhân nội soi sau phúc mạc dưới gây tê tê y sng.. Thời gian mổ trung bình 58,25 phút (35- 120). Điểm đau trung bình theo thang điểm VAS sau mổ 4 giờ : 1,5 (1-3), 8 giờ : 2,5 (1-4), 12 giờ : 1,7 (1-3), và thời điểm 24 giờ là 1 (0-2). Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 5,28 ngày (4-7 ngày). Tất cả các trường hợp đều hồi phục nhanh chóng và sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc để xử lý sỏi niệu quản dưới gây tê tê y sng hoặc cắt chèn nang thận dưới gây tê tê y sng là khả thi và hiệu quả cho bệnh nhân được mổ nội soi.



Hình minh họa

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 17:16 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 18 Tháng 2 2014 17:39

[Mời các bạn xem tiếp toàn văn tại đây](#)