

Phác đồ xử lý ngộ độc cấp heroin

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:52 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:12

Bs CKI Nguyễn Văn Kim - Khoa Cấp Cứu

Heroin (diacetylmorphin) có thời gian bán hủy 30 phút nhưng tác dụng kéo dài đến 4-6h

Heroin hòa tan trong lipid tốt hơn các opioid khác nên nhanh chóng khuếch tán qua hàng rào máu não (15 đến 20 giây) và đạt nồng độ cao trong não.

Heroin có thể sử dụng bằng đường hít, đường tiêm hoặc hút thuốc

Sử dụng nơp và phẩu thuật thuốc xuất hiện sau khi sử dụng mới ngày trong 1 đến 2 tuần, nếu dùng thuốc sẽ gây ra hội chứng cai thuốc.



I/ Biểu hiện của nghiện thuốc:

Phác đồ xử lý ngộ độc cấp heroin

Vị trí biên tập viên

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:52 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:12

1/ Thay đổi hành vi:

- Hạn chế các tiếp xúc xã hội
- Đốt ngất mất việc, thay đổi công việc không có lý do rõ ràng và vận động tài chính không gì thích đáng.
- Trầm cảm, chán ăn, có ý định tự tử.

2/ Thay đổi sinh lý:

- Sốt cao và rối loạn giấc ngủ
- Nhiễm trùng tại chỗ hoặc toàn thân
- Đau tiêm trên da hoặc vết tiêm ở các tĩnh mạch do tiêm nhiều lần
- Các bệnh lây truyền qua đường tình dục

3/ Tiếp cận bệnh nhân ngộ độc Heroin cấp:

a. Lâm sàng:

* Hội bệnh sơ:

Phác đồ xử lý ngộ độc cấp heroin

Vị trí biên tập viên

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:52 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:12

- Tình huống phát hiện bệnh nhân, xung quanh có bơm kim tiêm, thuốc viên hay thuốc bột không?

- Sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân (biểu hiện của hành vi cai thuốc, thay đổi hành vi, hoặc thay đổi sinh lý).

* Khám:

- Triệu chứng NĐC xảy ra vài phút sau khi tiêm và khoảng 15-30 phút sau khi uống

- Kích thích, giãn gáy, có thể lơ mơ rồi hôn mê sâu, mất hết các phản xạ (phản xạ nuốt, phản xạ giác mạc)

- Có đường thở xuất hiện trong vòng 5 phút sau tiêm thuốc kéo dài ít nhất 6 giờ

- Đường thở dẫn hoặc bình thường cũng có thể gặp khi quá liều meperidin, morphin, propoxyphen, dextromethophan, pentazocin hoặc khi uống mất chất kích thích khác như cocaine hoặc do tụt thân nhiệt do các chất hô hấp kéo dài.

- Thở chậm, ngừng thở tạm thời

- Vị trí tiêm ở cổ tay, TM cổ, TM đùi

- Có thể gặp hạ thân nhiệt, chóng mặt, nôn mửa, M nhanh.

Phác đồ xử lý ngộ độc cấp heroin

Viết bởi: Biên tập viên

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:52 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:12

- Số đo rờ i lo n th n kinh th c v t n ng n (tê li t th n kinh trung ng t m th i nh ng v n có th h i ph c)

b. Cận lâm sàng:

- Test nhanh heroin trong n c ti u

- Có th phát hi n heroin trong nhi u m u b nh ph m khác nh máu, n c b t, m hôi, h i th

- Xét nghi m n c ti u cho k t qu nhanh và ít t n kém nh ng có th d ng tính gi (khi s d ng rifampin, quinolone, ibuprofen, dextromethophan)

- Xét nghi m tìm các đ c khác: r u, Bbiturate, Benzodiazepin, Quinin, Amphetamin,...

- Khí máu đ ng m ch, X quang tim ph i th ng

- Glucose máu.



Viết bởi: Biên tập viên
Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 15:52 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 24 Tháng 4 2014 09:12