

Khoa Khám bệnh

Đái tháo đường là một tình trạng rối loạn chuyển hóa phức tạp do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là sự thiếu hụt hoặc kháng insulin. Tình trạng tăng đường huyết mãn tính sẽ gây ra tổn thương của nhiều cơ quan như mắt, thận, thần kinh, tim, mạch máu.

Các nghiên cứu phát triển, trong quá trình đô thị hóa đang làm thay đổi tập quán ăn uống, gia tăng hoạt động thể lực là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh đái tháo đường như tăng cân, béo phì, ít hoạt động thể dục, chế độ ăn không hợp lý v.v. Dẫn đến hàng năm có hàng triệu người tử vong do bệnh đái tháo đường. Nếu người bệnh đái tháo đường không được phát hiện và điều trị sớm sẽ dẫn đến nhiều biến chứng mạch máu lớn: nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, các biến chứng mắt (bệnh võng mạc, đục thủy tinh thể), biến chứng thần kinh: tê bì, mất cảm giác,... là gánh nặng cho nhiều gia đình và xã hội.



Chỉ tiêu chứng của bệnh đái tháo đường là ăn nhiều, đái nhiều, sút cân có thể 5-10 kg

Chế độ ăn uống khuyên dùng cho người bị bệnh đái tháo đường

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 15 Tháng 4 2015 09:28 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 15 Tháng 4 2015 09:36

trong vài tháng, người bị bệnh luôn có cảm giác đói và rất thích ăn ngọt. Bệnh và vảy không dễ xuất hiện như những triệu chứng nói trên mà ta nên kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng.

Hiện nay, bệnh đái tháo đường là bệnh xã hội đang phát triển nhanh trên thế giới và cả Việt Nam. Năm 1994, cả thế giới có 110 triệu người mắc bệnh, năm 2006 đã tăng lên 246 triệu, dự kiến năm 2025 sẽ tăng lên 300-330 triệu. Đây là một loại bệnh gặp cả nam và nữ, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội và mọi trình độ văn hóa khác nhau. Vảy pha loãng làm thế nào để hạn chế tiến triển mắc bệnh đái tháo đường mức thấp nhất, xin giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung về bệnh và người bệnh đái tháo đường tham khảo để hiểu tác dụng của thuốc chuyên khoa nhằm đem đến khỏe mạnh và hạnh phúc cho gia đình.

Chế độ ăn uống:

1) Ăn hạn chế chất bột, đường: Cụ thể dùng khoảng 200-400g/ngày như khoai lang, sắn, gạo (tổng lượng 4 lần bát cơm). Không ăn nhiều quá các loại thực phẩm làm tăng đường huyết cao như khoai tây, các loại bánh ngọt, đường, kẹo, mứt ong trổ khi bị hạn chế đường huyết (dùng không quá 30g/ngày).

2) Với những người béo phì: không ăn mỡ, bơ, lòng, óc, phụ tạng, đồ hộp; nên ăn các loại thịt có chứa ít chất béo: thịt, cá với lượng vừa đủ từ 100-150g/ngày, chú ý nên ăn thịt nạc bò, thịt gà bỏ da, cá nạc. Tăng cường các loại đậu, dâu thực vật từ các loại đậu: đậu phụ, đậu nành,... với lượng 10-20g/ngày. Tránh dùng thức ăn nướng, rán, quay, xào; ăn nhiều các loại chất xơ.

3) Tăng cường các loại trái cây như chú ý chọn các loại quả ít ngọt (cam, bưởi, dưa...). Hạn chế dùng các loại quả ngọt nhiều như mít, xoài, chuối, na,... Ăn không quá 200g/ngày, ăn nhiều lần/ngày, không nên ăn các loại quả sấy khô. Ăn đồ uống tất cả các loại rau tươi với lượng 300-400g/ngày như xúp lơ, xà lách, cà chua, giá đỗ, cải,....

* Chú ý: khi dùng chế độ trong ngày pha chế đạm béo chất đạm, béo, đường, vitamin, muối khoáng, nước với lượng hợp lý và pha chế vào cân nặng cụ thể: nữ: 30 calo/kg cân nặng/ngày, nam: 35 calo/kg cân nặng/ngày. Đạm béo tiêu chuẩn calo:

Chế độ ăn uống khuyên dùng cho người bị bệnh đái tháo đường

Vị trí biên tập viên

Thứ 15, 15 Tháng 4 2015 09:28 - Liên hệ nội dung tại Thứ 15, 15 Tháng 4 2015 09:36

Protid: 15-20%, Lipid: 15-18%, Glucid: 55-65%.

- Nên chia nhiều bữa /ngày cụ thể : 1/5 khẩu phần ăn vào buổi sáng, 2/5 vào buổi trưa, 2/5 vào buổi tối để tránh tình trạng tăng đường máu nhiều sau khi ăn, không làm hạ đường máu lúc xa bữa ăn. Nên giữ thói quen dùng các bữa ăn đúng giờ :

- Thí dụ một chế độ ăn trong ngày cung cấp năng lượng : 1500 calo với protid 84g, glucid 214g, lipid 35g; được chia 5 bữa ăn như sau:

+ Sáng: xôi đậu xanh (gạo nếp 50g, đậu xanh 20g).

+ Trưa: cơm 1 bát (70g), trứng vịt luộc một quả, bắp cải cuộn thịt nạc (bắp cải 300g, thịt 50g).

+ Chiều: súp đậu nành không đường 200ml, dưa 100g.

+ Chiều tối: cơm một bát (70g), đậu đỗ xào thịt nạc (thịt nạc 50g, đậu ăn 5g, 300g đậu đỗ), đu đủ 50g.

+ Tối: khoai lang luộc 100g

Chế độ tập luyện:

Vận động thể dục, thể thao là phương pháp điều trị hữu hiệu, nên gia tăng những có thể đem lại hiệu quả trong kiểm soát đường trong máu, hạn chế các biến chứng về bệnh tim mạch. Những cân nhắc chú ý tập luyện khi đường huyết <300mg/l và tuyệt đối không được tập luyện khi đường huyết >300mg/l. Nên tránh vận động lúc đói, tốt nhất nên tập trước và sau khi ăn 1-3 tiếng. Một khi tập luyện thì nên tập luyện

Chê đồ ăn uống khuyên dùng cho người bệnh đái tháo đường

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 15 Tháng 4 2015 09:28 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 15 Tháng 4 2015 09:36

mức độ nhẹ và trung bình từ 20 - 30 phút mỗi ngày (3-5 ngày trong tuần).



Chú ý: Trong quá trình tập luyện nếu chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, có cảm giác nhòe mắt hay huyết thì phải ngừng tập, có thể dùng ngay kẹo hoặc sữa, sau đó đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám.

Tóm lại, việc tập thể dục thể thao giúp người bệnh đái tháo đường duy trì khả năng lao động, ổn định cuộc sống. Có thể chọn các môn thể dục mà mình yêu thích: đi bộ, đạp xe, bơi lội, dưỡng sinh...

Người n: Điều Dưỡng Nội khoa - Nhi khoa, Trường Đại học Y Dược Huế, 2009