

Bs Lê Thanh Hùng -

Hội chứng vạt da chìm (hay còn gọi là hội chứng Trephined) là một biến chứng hiếm gặp xảy ra ở khoảng 10% các ca mổ mở ổ gai áp, xuất hiện vài tuần đến vài tháng sau phẫu thuật. Bệnh nhân mắc hội chứng này có đặc điểm vùng da đầu khuỷu t sẫm màu sâu xuất hiện kèm các biểu hiện thần kinh.

Biểu hiện của hội chứng vạt da chìm: đau đầu, suy giảm vận động, suy giảm nhận thức, co giật. Những triệu chứng hậu phẫu có thể có thoát vng ch lý (Paradoxal hernia), cuối cùng có thể dẫn đến hôn mê, tử vong nếu không được điều trị.


Trên CT ta có thể thấy hiện tượng kh i nh xóa rãnh và dịch chuyển đáng kể a theo hướng ngược lại của da đầu (mũi tên đỏ , mũi tên trắng), còn được gọi là 'thoát vng ch lý' (Hình 1 nh).

Phân biệt của hội chứng vạt da chìm sẽ dựa trên lâm sàng và hình ảnh CT Scan.

Hội chứng vạt da chìm – sinking skin flap syndrome

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 22 Tháng 5 2023 19:31 -



Hình ảnh: Hội chứng vạt da chìm trên CT

[Xem tiếp tại đây](#)