

Ds Nguyễn Thị Mai

Chẩn đoán sai thường dẫn đến việc sử dụng kháng sinh không đúng cách trong các bệnh viện, nghiên cứu mới phát hiện.

Sử dụng kháng sinh không đúng có thể gây ra tác hại cho bệnh nhân, làm giảm hiệu quả và làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh đáng lo ngại làm tăng chi phí cho người bệnh.

"Liều pháp kháng sinh được sử dụng cho khoảng 56 % bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện Mỹ, nhưng được tìm thấy là không phù hợp trong gần một nửa các trường hợp này, và nhiều trường hợp trong số đó đã thất bại trong điều trị với các chẩn đoán không chính xác". Filice và các đồng nghiệp đã phân tích 500 trường hợp bệnh nhân nội trú tại Trung tâm y tế Minneapolis VA. Họ phát hiện ra rằng việc sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh xảy ra với 95% bệnh nhân được chẩn đoán không chính xác hoặc không xác định, hoặc những người có triệu chứng xác định nhưng không có chẩn đoán. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí ngày 18 tháng 5 trong Infection Control & Bệnh viện Dịch tễ học, tạp chí Hiệp hội Y tế Dịch tễ học của Mỹ



Nghiên cứu cho thấy sự dùng kháng sinh không đúng thời gian do chẩn đoán sai

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 13 Tháng 6 2015 20:54 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 13 Tháng 6 2015 21:01

Các phát hiện cho thấy rằng các chương trình giám sát sử dụng kháng sinh trong bệnh viện sẽ hiệu quả hơn nếu được thiết kế để giúp các bác sĩ thực hiện các chẩn đoán ban đầu chính xác để chọn đúng kháng sinh một cách hợp lý và an toàn.

Các nhà nghiên cứu cho biết đưa vào trình giác hơn là phân tích đúng đắn các căn cứ khoa học đã góp phần sử dụng không hợp lý thuốc kháng sinh tại các bệnh viện. Các yếu tố khác góp phần vào một phần của nhân viên y tế như: mệt mỏi, mệt ng, tinh thần quá tải, dễ phớt lờ các bệnh nhân với chẩn đoán trước đó một số yếu tố thiêu kinh nghiệm lâm sàng, và thiêu kinh nghiệm với các hiệu ứng phụ của thuốc.

Theo Ông Filice "Chẩn đoán chính xác là rất cần thiết để sử dụng kháng sinh một cách hợp lý và an toàn cho người ở bệnh. Để cải thiện việc sử dụng kháng sinh trong chăm sóc sức khỏe cần phải xem xét các thách thức và tìm kiếm công cụ và chiến lược giúp các bác sĩ lâm sàng trong việc chẩn đoán bệnh".

Nguồn: drugs.com