

Bs CKI Đặng Ngọc Thành - Khoa Cấp cứu

Sau Tết nguyên đán Bính Thân 2016 bệnh nhân bệnh xu hướng tiêu hóa nhập viện tại khoa Cấp cứu gia tăng, đa số bệnh nhân đều có biểu hiện thiếu máu nặng, choáng giập mất tích do mất máu phải truyền dịch, truyền máu với số lượng đáng kể, kéo dài thời gian nằm viện. Ngoài những bệnh nhân trước đây đã có xu hướng vài lần do viêm loét dạ dày, tá tràng, vết tĩnh mạch trĩ hoặc thủng quầng do xơ gan... là “khách quen” của bệnh viện thì một đối tượng đáng chú ý là xu hướng tiêu hóa có xu hướng trở nặng, xảy ra ở thanh niên đang tuổi “bỡ ngỡ sống trâu” mà tiền sử chưa hề có biểu hiện bệnh lý dạ dày, gan, ruột. Vậy nguyên nhân do đâu?



Qua khai thác bệnh sử, chúng tôi nhận thấy rằng:

Nhóm những người trẻ uống bia xu hướng tiêu hóa là những người nghiện rượu trong thời gian dài dẫn đến xơ gan, viêm loét dạ dày, đã nhập viện nhiều lần, sau mỗi lần nhập viện đều có số đo

Rượu, bia và xu hướng tiêu hóa

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 19:12 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 19:18

dò cạo bác sĩ và nhân viên y tế nên không uống rượu và bia như mọi người thường làm. Vì vậy, sinh chức năng, đặc biệt là vì quá vui vẻ nên uống rượu bia và bia như mọi người thường làm.



Rượu, bia là nguyên nhân chính gây xu hướng tiêu hóa (Hình minh họa)

Nhóm người trẻ tuổi thanh niên trẻ khỏe không có các triệu chứng đau, chướng viêm có thể hình thành nên dạ dày ruột uống rượu bia với số lượng nhỏ và nhất là uống lúc buổi tối nên dẫn đến loét dạ dày gây xu hướng tiêu hóa. Điều đáng lưu ý nhất là nhóm người này là một số bệnh nhân vào viện không phải vì lý do nôn ra máu hay đi cầu phân đen mà chủ yếu bị viêm dạ dày, chán ăn, đau bụng lâm râm mờ nhạt, vào viện lúc ban đêm khám thấy da xanh xao, huyết áp thấp hoặc hạ huyết áp, ngoài ra không thấy có gì đặc biệt, tiền sử khỏe mạnh nên đôi lúc người thầy thuốc ít nghĩ đến xu hướng tiêu hóa mà thường nghĩ đến một bệnh lý về máu hay một bệnh toàn thân khác, vài giờ hoặc vài ngày sau bệnh nhân mới nôn ra máu đỏ tươi và/hoặc đi cầu phân đen. Nên nhóm trẻ tuổi này theo kinh nghiệm của chúng tôi, cần thận trọng theo dõi thăm khám trực tràng kết hợp với nội soi để phát hiện sớm.

Rượu, bia và xu hướng tiêu hóa

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 19:12 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 17 Tháng 3 2016 19:18

[illegible]