

Các thói đời m d u ng thu c

Vi t b i Biên t p viên

Th năm, 24 Tháng 11 2016 19:14 - L n c p nh t cu i Th năm, 24 Tháng 11 2016 19:23

Ds Lê Th Di u Hi n

Khi u ng thu c, h u nh m i ng i ch quan tâm đ n hi u qu mà ít chú ý đ n th i đ i m u ng trong ngày. Vì v y đ nâng cao hi u qu đ i u tr ph i chú ý đ n s t ng tác gi a các thu c v i nhau ho c đôi lúc gi a thu c và th c ăn cũng có th nâng cao ho c làm gi m tác d ng c a thu c, gây nên nh ng h u qu có khi r t nghiêm tr ng.

*U ng vào b a ăn

- Các lo i thu c kích thích s bài ti t d ch tiêu hóa nh các thu c đ i u tr thay th enzym tiêu hóa nh pepsin, acid hydrocloric ...nên u ng tr c khi ăn ch ng 15-30 phút
- Nh ng thu c kích ng m nh đ ng tiêu hóa nh doxycyclin, kháng sinh nhóm quinolon ...Nh ng thu c này u ng vào lúc ăn vì th c ăn không làm gi m h p thu thu c
- Nh ng thu c h p thu nhanh lúc đói, d n đ n vi c tăng tác d ng ph do s tăng n ng đ đ t ng t trong máu nh levodopa, seduxen ...

Các thí nghiệm để hiểu thuốc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 19:14 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 19:23



Thí nghiệm này nhằm mục đích kiểm tra sự hấp thụ của thuốc trong cơ thể. Việc sử dụng nước và thuốc là để mô phỏng điều kiện thực tế khi bệnh nhân uống thuốc. Thời gian chờ đợi giữa việc uống thuốc và việc đo lường là để đảm bảo rằng thuốc đã được hấp thụ đầy đủ.