

Bs Vũ Thanh Lê Thuỷ - Nội khoa-Nutritionist

NEW YORK (Reuters Health) - Nhóm phát hiện mới cho thấy, hai phần ba phụ nữ mắc bệnh đái tháo đường type 2 có khuyết tật xương xung quanh khớp và vi khuẩn trú xâm nhập.


"Ngoài lão hóa, kiềm soát đường huyết kém có thể đóng một vai trò quan trọng trong tuổi già, có thể liên quan đến những thay đổi về sức khỏe xương và phụ nữ đái tháo đường type 2", Fang-Ping Chen của Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial ở Keelung, Đài Loan, và các đồng nghiệp kết luận trong *Thesis defended on ngày 20 tháng 8*.

Bệnh đái tháo đường type 2 làm tăng khả năng gãy xương do loãng xương của một người, tăng nguy cơ lên 2-3 lần 30%, nhưng cũng chưa liên quan rõ ràng. Các nghiên cứu vẫn một định khoáng xương (BMD) ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có kết quả khác nhau, trong khi các nghiên cứu sử dụng chụp cắt lớp vi tính để nhận biết người có độ phân giải cao không tìm thấy bằng chứng quan trọng cho thấy phụ nữ đái tháo đường type 2 có chấn thương xương kém hơn.

TÍ lÝ thoái hóa xương cao ở phổi nở bít đái tháo đường type 2

VĨết bÃi Biên tÍp viên

Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 15:33 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 15:42



Trang 1/2 | TÍlý thoái hóa xương cao ở phổi nở bít đái tháo đường type 2 |