


Bs Huỳnh Minh Nhật -

GIỚI THIỆU

Nuốt phải dấu vết là tình trạng thường gặp trong thực hành lâm sàng. Phần lớn trường hợp nuốt dấu vết xảy ra ở trẻ em. Việc nuốt phải dấu vết thường vô ý hay vô ý, hay gặp ở người cao tuổi, người có rối loạn tâm thần chậm phát triển trí tuệ, người đờ đẫn và nghiện rượu.

Hầu hết dấu vết (80 - 90%) đi ra ngoài một cách tự nhiên. Tuy nhiên, khoảng 10 - 20% trường hợp cần phải xử lý ngay và ít hơn 1% số cần phải phẫu thuật để lấy dấu vết hoặc để điều trị các biến chứng.



CHẨN ĐOÁN

Trẻ em và người lớn có thể xác định được nuốt phải dấu vết và chỉ ra vùng khó chịu. Tuy nhiên, dấu tích của vùng khó chịu thường không đáng quan tâm vì vị trí bị chèn ép. Thông thường, các triệu chứng xảy ra ngay sau khi nuốt phải dấu vết. Trẻ nhỏ hay người bị rối loạn tâm thần có thể biểu hiện bằng ngất xỉu, buồn nôn, nôn mửa, chảy nước dãi, thở khò khè, nước bọt dính máu hoặc suy hô hấp. Thở hổn hển hoặc đau ngực dữ dội thường có thể gây sốc, đau, căng đau vùng cổ. Các bác sĩ lâm sàng cần phải nhận biết tình trạng cần phải phẫu thuật như viêm phúc mạc hoặc tắc ruột non.

[Xem tiếp tại đây](#)

Lý do viết đơn ng tiêu hoá trên qua nội soi

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 03 Tháng 3 2024 17:42 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 05 Tháng 3 2024 17:59
