

Một số tình trạng tác dụng của thuốc khi sử dụng

Vị trí biên tập viên

Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:09 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:16

Đa dạng Thuốc Ngộ độc Hà -

STT	Họ chất	Tương tác	Mức độ	Cơ chế	Hậu quả	Giải pháp
1	Amikacin	Paracetamol	Nguy hiểm	Tăng độc tính trên thận và ảnh hưởng đến gan (paracetamol)	Tăng độc tính trên thận và ảnh hưởng đến gan (paracetamol)	Nên tránh phối hợp, nếu bắt buộc phải phối hợp nên giảm liều paracetamol và theo dõi chặt chẽ.
2	Amiodaron	Digoxin	Nguy hiểm	Làm tăng nồng độ Digoxin trong máu	Giảm độc tính	Nên giảm liều Digoxin từ 1/3 liều Digoxin ban đầu đến 1/2 liều Digoxin ban đầu và tiếp tục theo dõi chặt chẽ nồng độ Digoxin trong máu. Tập hợp theo dõi các dấu hiệu ngộ độc như nôn, buồn nôn, rối loạn nhịp tim.
3	Amiodaron	Morphine	Nguy hiểm	Tăng tác dụng ức chế trung tâm hô hấp	Nguy cơ độc tính trên trung tâm hô hấp	Chống chỉ định phối hợp
4	Aspirin	Heparin (tổng)	Nguy hiểm	Tăng nguy cơ chảy máu	Tăng nguy cơ chảy máu	Nên tránh phối hợp 2 thuốc, nếu bắt buộc phải phối hợp 2 thuốc, cần theo dõi chặt chẽ các chỉ số xét nghiệm đông máu định kỳ và theo dõi các dấu hiệu chảy máu.
5	Aspirin	Ketorolac	Nguy hiểm	Làm tăng tác dụng phụ của Ketorolac	Tăng nguy cơ loét dạ dày và xuất huyết	Chống chỉ định phối hợp

[Xem tiếp đây](#)