

Trên Themed Kim San -

Cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh (MHRA) thông báo về tình trạng giảm nồng độ vitamin B12 trong máu hay là thiếu vitamin B12 cần được xem xét là một tác động không mong muốn phụ biến của bệnh nhân điều trị metformin, đặc biệt là bệnh nhân ngấm liều uống liều cao, điều trị kéo dài hoặc có bệnh nhân có nguy cơ.

Bệnh nhân thiếu vitamin B12 có thể không triệu chứng hoặc biểu hiện triệu chứng của bệnh thiếu máu hồng cầu to khổng lồ (megaloblastic anaemia) hoặc bệnh lý thần kinh (neuropathy) hoặc cả hai. Các triệu chứng khác của giảm nồng độ vitamin B12 có thể bao gồm rối loạn tâm thần (trầm cảm, kích thích, suy giảm nhận thức), viêm lưỡi, loét miệng, rối loạn tầm nhìn, rối loạn vận động. Đối với bệnh nhân thiếu máu hoặc bệnh lý thần kinh do thiếu vitamin B12 cần thiết để chẩn đoán và điều trị ngay khi có thể để tránh tiến triển thành các triệu chứng vĩnh viễn.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 6 2022 22:09 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 6 2022 22:15



[Xem tiếp tại đây](#)