

Thay đổi đường dùng kháng sinh đi u tr

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 09:46 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 10:18

Ds. Lê Thị Cẩm Nhung -

Thay đổi đường dùng kháng sinh từ đường tiêm truyền sang đường uống giúp giảm chi phí nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng điều trị, giúp thúc đẩy chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn. Nâng cao hiểu quả điều trị nhiễm trùng, đảm bảo an toàn giảm thiểu biến chứng bất lợi cho người bệnh, giảm khả năng xuất hiện đề kháng của vi sinh vật gây bệnh.

I. Chỉ định lựa chọn thay đổi đường dùng kháng sinh

- Thực hiện ngay khi có kết quả vi sinh xác định tác nhân gây bệnh

- Nếu không có kết quả vi sinh, chuyển đổi đường dùng kháng sinh theo thực hiện khi bệnh nhân có đáp ứng điều trị tốt, khi đó dựa trên cơ sở dữ liệu vi sinh tại bệnh viện hiện nay để phán đoán, lựa chọn kháng sinh hợp lý.

- Các giai đoạn :

+ Giai đoạn 1: Khi điều trị dùng phác đồ kháng sinh phù hợp nhưng làm tăng hiểu quả và giảm thiểu đề kháng kháng sinh.

+ Giai đoạn 2 : Tập trung vào việc thực hiện liệu pháp thay đổi đường dùng kháng sinh với mục tiêu giảm thiểu đề kháng của kháng sinh, giảm sử dụng kháng thuốc của vi khuẩn và tăng hiểu quả kinh tế.

Thay đổi dùng kháng sinh điều trị

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 09:46 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 10:18



[Xem tiếp tại đây](#)