

Khoa Dược

Etoricoxib thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), có tác dụng cản chẹn lõi COX-2. Etoricoxib đặc biệt sử dụng làm giảm triệu chứng trong các trường hợp thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm đột sống dính khớp, triệu chứng đau và viêm trong các cơn gout cấp. Etoricoxib cũng đặc biệt sử dụng điều điều trị hen trong các trường hợp đau mức độ trung bình sau khi phẫu thuật nha khoa.



Tại Việt Nam, etoricoxib đã đặc biệt cấp phép lưu hành với nhiều biệt dược khác nhau (Arcoxia, Agietoxib, Etoricoxib OPV, Fecotex, Magrax, Zostopain, Bambizol).

Tùy theo các thuốc cản chẹn lõi COX-2 khác nguy cơ tăng biến cố tim mạch của etoricoxib tăng lên khi tăng liều và kéo dài thời gian sử dụng thuốc. Do vậy, chỉ sử dụng etoricoxib với liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Liều dùng trong điều trị đặc biệt chẹn đột nhịp thường sau:

- Thoái hóa khớp: 30mg, 1 lần/ngày, có thể tăng lên 60mg/ngày, trong trường hợp tăng dần mức liều 60mg/ngày mà không cần thiền hiệu quả điều trị thì cân nhắc thay thế bằng thuốc khác.
- Viêm khớp dạng thấp, viêm đột sống dính khớp: 90mg, 1 lần/ngày.
- Cơn gout cấp: chỉ định giảm đau với liều khuyên cáo là 120mg, 1 lần/ngày, thời gian điều trị

Thông tin về tác dụng phụ thuốc Etoricoxib

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:39 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ năm, 19 Tháng 6 2014 09:54

tối đa là 8 ngày.

- Sau khi phun thuốc nha khoa: chỉ định giảm đau và liều dùng dùng là 90mg, 1 lần/ngày, thời gian điều trị tối đa là 3 ngày.

Ngoài những chỉ định chính và các tác dụng không mong muốn của Etoricoxib, trong quá trình sử dụng etoricoxib điều điều trị cho bệnh nhân cần lưu ý một số khuyễn cáo sau:

- Nguy cơ tim mạch của etoricoxib có thể tăng lên khi tăng liều và kéo dài thời gian sử dụng thuốc, do đó chỉ sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Đáp ứng điều trị của bệnh nhân cần được định kỳ đánh giá lại.
- Trong quá trình điều trị, nếu gặp phản ứng bất lợi, cần cảnh giác ngừng sử dụng etoricoxib và thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp.
- Sử dụng thận trọng etoricoxib với các đối tượng bệnh nhân có nguy cơ cao mắc biến cố tim mạch (tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá).

Nguồn: Journal of pharmaceutical research and drug information