

Không nên sử dụng lidocain 2% để điều trị đau do mất răng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ tư, 24 Tháng 12 2014 10:17 -

Ds Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trong năm 2014, FDA đã nhận được 22 trường hợp báo cáo phản ứng bất lợi, bao gồm cả tử vong đối với trẻ em từ 5 tháng tuổi đến 3,5 tuổi sử dụng dung dịch lidocain 2% để điều trị đau răng, viêm miệng hoặc do trẻ vô tình nuốt vào đường tiêu hóa. Do đó FDA đã yêu cầu nhà sản xuất bổ sung vào phần “cảnh báo đặc biệt” trong tài liệu hướng dẫn các nguy cơ gặp các phản ứng nghiêm trọng và bổ sung hướng dẫn về liều dùng khi kê đơn.

Tôi Anh các chế phẩm chứa lidocain 2% chỉ dùng cho trẻ em trên 12 tuổi. Đối với trẻ em trên 3 tháng tuổi, có thể sử dụng chế phẩm chứa lidocain 0,3%, 0,5% và 0,6% nhưng cần phải tuân thủ liều dùng và hướng dẫn cách dùng các loại dùng tại chỗ là 3 giờ. Tại Việt Nam, một số chế phẩm chứa lidocain 2% đã được cấp phép đăng ký lưu hành như Kamistad-Gel N, Xylocain gel 2%.



FDA khuyến cáo khi dùng lidocain như sau:

- Không nên kê đơn thuốc chứa lidocain hoặc benzocain dùng dung dịch, gel để điều trị đau do mất răng do có thể gây ra các tác động bất lợi nghiêm trọng bao gồm co giật, methemoglobin và tử vong.
- Dung dịch lidocain trong dấu không được FDA phê duyệt để điều trị đau do mất răng.
- Hướng dẫn cha mẹ và người chăm sóc tuân theo khuyến cáo khi sử dụng lidocain để làm giảm đau do mất răng:

Không nên sử dụng lidocain 2% để điều trị đau do mọc răng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 6, 24 Tháng 12 2014 10:17 -

- Sử dụng vòng ngậm mọc răng để trong ngăn mát tủ lạnh(không để đông đá)
- Các nhà hàng hoặc mát xa newborns để massage ngón tay để làm giảm các triệu chứng.
- Sử dụng thuốc bôi hoặc tiệt vào newborns có thể gây tác động bất lợi nghiêm trọng nếu dùng quá nhiều và trẻ nuốt phải một lượng lớn.

Tài liệu tham khảo:

1. Các giác dục – Số 4-2014
2. Dược Thư Việt Nam - 2012