Các n□i dung thay đ□i, b□ sung đ□i v□i thu□c ch□a phospholipid đ□u nành

Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ b□y, 26 Tháng 1 2019 11:15 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ b□y, 26 Tháng 1 2019 11:18

Ds Ph□m Phú Trí - Khoa D□□c

Công văn s□ 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 c□a C□c Qu□n lý D□□c g□i S□ Y t□ các t□nh, thành ph□ tr□c thu□c trung □□ng; Các b□nh vi□n, vi□n có gi□□ng b□nh tr□c thu□c B□ Y t□; Các công ty đăng ký, s□n xu□t thu□c l□u hành t□i Vi□t Nam v□ vi□c c□p nh□t thông tin h□□ng d□n s□ d□ng đ□i v□i thu□c ch□a phospholipid đ□u nành.



Đ□ th□ng nh□t v□ ch□ đ□nh, ch□ng ch□ đ□nh, li□u dùng và cách dùng thu□c ch□a phospholipid đ□u nành, căn c□ k□t lu□n c□a H□i đ□ng T□ v□n c□p gi□y đăng ký l□u hành thu□c, nguyên li□u làm thu□c - B□ Y t□; nh□m đ□m b□o m□c tiêu s□ d□ng thu□c h□p lý, an toàn và hi□u qu□.

Các n□i dung thay đ□i/ b□ sung đ□i v□i thu□c ch□a phospholipid đ□u nành (Đính kèm theo công văn 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 c□a C□c Qu□n lý D□□c) c□ th□ nh□ sau:

[Đ□i v□i t□t c□ các thu□c ch□a phospholipid đ□u nành, thông tin trên nhãn thu□c và t□ h□□ng d□n s□ d□ng yêu c□u thay đ□i n□i dung các m□c Ch□ đ□nh, Ch□ng ch□ đ□nh, Li□u dùng và cách dùng theo đúng các thông tin đ□□c cung c□p d□□i đây]

1. Chỉ định:

Cải thiện các triệu chứng bệnh lý gan như chán ăn, đau hạ sườn phải, tổn thương gan do nhiễm độc và viêm gan.

2. Chống chỉ định:

Quá mẫn với protein đậu nành, đậu lạc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

3. Liều dùng và cách dùng:

• Người lớn: 1800 mg/ngày chia 2 - 3 lần.

• Nên uống thuốc cùng bữa ăn.

• Không nên sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 18 tuổi do chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Nguồn: http://www.dav.gov.vn/