

Bệnh nhân tăng huyết áp (THA) sử dụng thuốc chống viêm phi steroid (NSAID) với liều dùng khác nhau. Các thuốc NSAID ức chế gián tiếp qua trung gian prostaglandin và làm tăng giải phóng và nồng độ trong cơ thể. Cả hai cơ chế này đều góp phần làm các thuốc NSAID đối kháng một phần tác dụng của thuốc điều trị THA, đặc biệt với những thuốc có cơ chế tác dụng tác động thông qua prostaglandin, renin hoặc cân bằng natri và nồng độ trong cơ thể. Liều và khoảng thời gian dùng NSAID là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đối kháng tác dụng hạ huyết áp của những thuốc này. Dùng phối hợp NSAID ở liều cao và trong khoảng thời gian hơn 1 tuần thì có khả năng làm tăng huyết áp hơn.

Các thuốc NSAID ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị THA ở các mức độ khác nhau. Thuốc lợi tiểu, ức chế men chuyển, chẹn beta và ức chế thụ thể angiotensin II là các thuốc dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự vô hiệu hóa tác dụng hạ huyết áp gây ra bởi NSAID. Các thuốc chẹn kênh calci và thuốc hạ áp theo cơ chế trung tâm ít bị ảnh hưởng hơn.

Chú ý t  ng tác khi ph  i h  p thu  c ch  ng viêm phi steroid (NSAID) v  i thu  c đi  u tr   tăng huy  t áp

Vi  t b  i Biên t  p viên

Th   ba, 14 Tháng 8 2012 20:18 - L  n c  p nh  t cu  i Th   ba, 14 Tháng 8 2012 20:44

