

Ngày 22/06/2012, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đưa ra thông báo về việc hạn chế sử dụng các thuốc chẹn alpha tolperison sau khi đánh giá lợi ích/nguy cơ của thuốc.

Tolperison là thuốc có tác dụng giãn cơ để chẹn để điều trị một số trường hợp như co cứng cơ do rối loạn thần kinh, có thể liên quan đến bệnh cột sống và khớp liên nhũ xương hông, bệnh mạch máu, phình động mạch sau phẫu thuật và bệnh Little (còn được gọi là bệnh bại não). Tolperison đã được cấp phép lưu hành ở một số nước châu Âu từ những năm 60.



Việc đánh giá lợi ích/nguy cơ của tolperison để uống đã ưu tiên lợi ích. Cơ quan Quản lý

Giới hạn chế độ nhớt của các thuốc chứa tolperison đường uống, không nên sử dụng tolperison đường tiêm

Vị trí biên tập viên

Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 08:49 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 09:12

Dược phẩm Dược chế phê duyệt cho độ nhớt của các thuốc sau đợt què cho tolperison đường tiêm cho rằng hiệu quả của tolperison không chứng minh được đối với những chế độ khác. Thêm vào đó, nhiều báo cáo về phản ứng quá mẫn nghiêm trọng xảy ra khi sử dụng tolperison đã được báo cáo ở Đức. Do đó, ngày 15/07/2011, Đức đã khởi kiện Ủy ban thuốc sử dụng trên người (CHMP) của EMA xem xét, thông nhận quy định độ nhớt của lý do với tolperison trong các thuốc đường tiêm châu Âu.

CHMP sau khi xem xét các dữ liệu về hiệu quả của tolperison đường uống và đường tiêm đối với các chế độ khác nhau đã đưa ra kết luận rằng lợi ích của tolperison chế độ tiêm trị hơn so với nguy cơ của thuốc khi sử dụng để điều trị cơ cứng sau đợt què và dùng đường uống.

Theo đó, CHMP khuyến cáo tất cả các cán bộ y tế:

- Thông báo tất cả cán bộ y tế về giới hạn chế độ nhớt của tolperison đường uống là điều trị cơ cứng sau đợt què. Không kê đơn tolperison cho tất cả các chế độ khác.

- Không nên sử dụng tolperison đường tiêm.

- Thông báo cho bệnh nhân các phản ứng quá mẫn có thể gặp phải trong quá trình điều trị bệnh tolperison. Nếu xuất hiện các triệu chứng quá mẫn, lập tức ngừng sử dụng thuốc.

Khuyến cáo tất cả bệnh nhân:

- Hiệu quả lợi ích của tolperison đường uống và chế độ tiêm trị hơn nguy cơ của thuốc khi dùng với chế độ điều trị cơ cứng sau đợt què.

- Bệnh nhân đang sử dụng tolperison cho các chế độ khác hoặc tolperison đường tiêm cần gặp bác sĩ điều trị để lựa chọn thuốc thay thế thích hợp.

Giới hạn chỉ định của các thuốc chống co thắt tolperison đối tượng, không nên sử dụng tolperison đối tượng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 08:49 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 09:12

- Trong quá trình điều trị bệnh tolperison, cần ngừng sử dụng thuốc và thông báo ngay với cán bộ y tế nếu xuất hiện các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn, phát ban ngứa (nếu ngứa lan), thở khó khăn, khó thở, khó nuốt, tim đập nhanh, huyết áp thấp hoặc giảm nhanh huyết áp.

- Liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu có thắc mắc.

Ds. Nguyễn Thị Mai - Nguồn tin từ báo tin Công nhân giác ngộ