

# Một số thông tin tác dụng của một số loại thuốc khi sử dụng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:09 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 31 Tháng 7 2021 21:16

## Danh sách Thuốc Ngộ độc -

STT	Họ chất	Tung tác	Mức độ	Cơ chế	Hậu quả	Giải pháp
1	Amikacin	Furosemid	Nguy hiểm	Tăng nồng độ Amikacin trong máu và mô	Tăng độc tính trên thận và thính giác (nghe tiếng)	Nên tránh phối hợp, nếu bắt buộc phải phối hợp nên theo dõi sát thận và thính giác trước và trong quá trình điều trị.
2	Amiodaron	Digoxin	Nguy hiểm	Làm tăng nồng độ Digoxin trong máu	Ô nhiễm độc	Nên giảm 1/2 đến 1/3 liều digoxin khi bắt đầu dùng amiodaron và tiếp tục giảm chính liều sau 1 hoặc 2 tuần, có thể sau 1 tháng sử dụng ngừng dùng amiodaron. Tiếp tục theo dõi các dấu hiệu ngộ độc như nôn, buồn nôn, rối loạn nhịp tim.
3	Amiodaron	Morfocaciac	Nguy hiểm	Tăng tác dụng ức chế dẫn truyền QT	nguy cơ độc tính trên tim mạch	Chống chỉ định phối hợp
4	Aspirin	Heparin (máu)	Nguy hiểm	Tăng nguy cơ chảy máu		Nên tránh phối hợp 2 thuốc, nếu cần phải phối hợp 2 thuốc, chỉ theo dõi chặt chẽ các chỉ số xét nghiệm đông máu định kỳ và biến hiện xuất huyết trên lâm sàng.
5	Aspirin	Ketococac	Nguy hiểm	Làm tăng tác dụng phụ của Ketococac	Tăng nguy cơ loét dạ dày và xuất huyết	Chống chỉ định phối hợp

[Xem tiếp đây](#)