

Ds Bùi Văn Nghĩa

Đúng tránh các mất người bệnh có tránh thái bệnh lý đặc biệt, người thầy thuốc cần hết sức cân nhắc khi dùng thuốc cho bệnh nhân, để tránh tai nạn đáng tiếc do thuốc. Mất sự tránh thái bệnh lý, mất sự thuốc chính **ch** *m dùng* hoặc *ph* *i dùng thận trọng*:

1. Mang thai

- **Ba tháng đầu của thai kỳ hoặc người nghi có thai:** Thuốc chống gián phân (cyclophosphamid, methotrexat, vinblastin, busulfan, clorambucil...), thuốc chống nôn (cyclizin, meclozin, dimenhydrinat...), thuốc chống đau kinh, chống sốt rét, thuốc nhuộm trắng chứa podophylin, penicilamin, thalidomid, thuốc chống trầm cảm ba vòng, lithium, furosemid, rifampicin, trimethoprim (trong co-trimoxazol), pyrimethamin, thuốc chống tiu đờng...

Cần tránh khi dùng thuốc cho người bệnh có bệnh lý đái tháo đường

Viết bởi Biên tập viên

Chức nhật, 16 Tháng 9 2012 20:38 - Lần cập nhật cuối Chức nhật, 16 Tháng 9 2012 21:05



[REDACTED]