

BS Nguyễn Anh Khiêm -

Prostaglandin E2 là một loại thuốc được FDA chấp thuận sử dụng để loại bỏ các phôi thai trong tử cung và khởi phát chuyển dạ. Nó thuộc nhóm thuốc prostaglandin. Bài này đề cập đến các chỉ định và chống chỉ định đối với prostaglandin E2 khi nó được sử dụng làm thuốc phá thai hoặc chất gây chuyển dạ. Nội dung bài này sẽ làm rõ các chỉ định, các tác dụng phụ và các yếu tố liên quan (ví dụ: sử dụng ngoài hướng dẫn, liều lượng, đặc tính dược lý, đặc tính dược động học, theo dõi, tương tác có liên quan).

1. CHỈ ĐỊNH

Prostaglandin E2 (PGE2), còn được gọi là dinoprostone, là một hợp chất tự nhiên liên quan đến việc thúc đẩy quá trình chuyển dạ, mặc dù nó cũng có mặt trong cơn đau gây viêm.

Prostaglandin E2 được FDA chấp thuận cho việc làm chín muồi cổ tử cung để khởi phát chuyển dạ ở phụ nữ sinh nhân có chỉ định y khoa và khởi phát. Khi được sử dụng làm thuốc để tăng âm độ, nó được chỉ định làm thuốc phá thai từ tuần thai thứ 12 đến 20 hoặc để loại bỏ các phôi thai bên trong tử cung trong quản lý sảy thai và thai chết trong tử cung cho đến 28 tuần.

Prostaglandin E2 cũng được sử dụng trong quản lý bệnh nguyên bào nuôi trong thai kỳ. Điều quan trọng, nó không phải là một tác nhân gây hại cho thai. Do đặc tính oxytocic của nó, việc sử dụng dinoprostone cần nên lưu ý thích hợp bởi các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm.

Prostaglandin E2 (Dinoprostone)

Vị t b i Biên t p viên

Th ba, 25 Tháng 4 2023 20:31 - L n c p nh t cu i Th ba, 25 Tháng 4 2023 20:46

