


Hòn chóp sụn dẻo lâu dài các thuốc có chứa calcitonin, thuốc điều trị loãng xương

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 09:38 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 09:47

Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu (EMA) khuyến cáo hòn chóp sụn dẻo lâu dài các thuốc có chứa calcitonin, thuốc điều trị loãng xương, giảm nguy cơ gãy xương, do có bằng chứng cho thấy sụn dẻo lâu dài của các loại thuốc này có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư. Các thuốc có chứa calcitonin điều trị loãng xương không còn được khuyến cáo điều trị loãng xương.



Ngày 20/07/2012, Ủy ban các sản phẩm thuốc dùng cho người (CHMP) thuốc Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã khuyến cáo các thuốc có chứa calcitonin nên được sử dụng trong điều trị loãng xương, vì mối liên hệ tiềm ẩn giữa chúng, do có bằng chứng cho thấy sụn dẻo lâu dài của các loại thuốc này có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư. Các thuốc có chứa calcitonin điều trị loãng xương không còn được khuyến cáo điều trị loãng xương.

Sau khi cân nhắc những hiểu lầm về việc sử dụng calcitonin trong điều trị loãng xương sau mãn kinh để giảm nguy cơ gãy xương cột sống, CHMP kết luận rằng lợi ích của thuốc có chứa calcitonin không vượt trội nguy cơ trong trường hợp này. Do đó, thuốc điều trị loãng xương không còn được khuyến cáo.

Hội chứng suy giảm lâu dài các thụ thể có chẹn calcitonin, thu hút dòng bào chèn dùng dòng ng mũi

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 09:38 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 19 Tháng 11 2012 09:47

đuyết s giảm trong đi u tr loãng xương, CHMP đã khuyến cáo thu hút dòng bào chèn này.

Đi với các chèn đnh khác đã đc phê duyệt, tuy lợi ích v n v t tr i h n nguy c c a thu c, nh ng CHMP khuyến cáo calcitonin ch n đc dùng đ đi u tr trong th i gian ng n nh t có th . Đi với b nh nhân m c b nh Paget, CHMP cũng đ ngh gi i h n calcitonin ch là ch đnh hàng 2 (second line) cho nh ng b nh nhân không đáp ng v i ph ng pháp đi u tr khác ho c không phù h p v i các ph ng pháp đi u tr khác. Đi u tr trong tr ng h p này nên gi i h n đ n 3 tháng, có th đc kéo dài đ n 6 tháng trong m t s tr ng h p đc bi t, và có th đc l p i gián đ n n u cân nh c th y nh ng l i ích v t tr i rõ r t h n nguy c

Các khuyến cáo c a CHMP cho cán b y t c th nh sau:

- Lưu ý không đc ch đnh calcitonin đ đi u tr loãng xương.

- Calcitonin ch đc dùng đ i dòng dung đ ch đ tiêm ho c truy n trong các ch đnh:

- Phòng ngừa m t xương c p tính do b t dòng đ t ng t, đ t đi u tr đc khuyến cáo kéo dài hai tu n, t i đa là b n tu n;
- B nh Paget, ch gi i h n cho nh ng b nh nhân không đáp ng các ph ng pháp đi u tr khác ho c không phù h p v i các ph ng pháp đi u tr khác, th i gian đi u tr đc gi i h n đ n ba tháng (có th kéo dài thêm và tái đi u tr đnh k sau khi đã cân nh c l i ích và nguy c).
- Tăng calci máu ác tính.

- Gi i h n đi u tr b ng calcitonin trong th i gian ng n nh t có th và s dòng m c li u t i thi u có hi u qu .

DS. Hoàng Văn Nam

(Nguồn: canhgiacduoc.org.vn)