

Ds Nguyễn Thị Mai

Thuốc NSAID được sử dụng trên toàn thế giới để giúp đỡ những người có tình trạng viêm, chẳng hạn như viêm khớp dạng thấp. Một chương trình phân tích mới đã khuyến cáo, những người dùng liều cao thuốc giảm đau thông thường được gọi là thuốc chống viêm không steroid (NSAID) phải đặc biệt cẩn trọng về nguy cơ bệnh tim.

Xem xét gần 650 thử nghiệm ngẫu nhiên đã phát hiện ra rằng sử dụng liều 2.400mg Ibuprofen hoặc 150mg diclofenac hàng ngày làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong. Kết quả này được công bố trên tạp chí ngày 29 tháng 5 năm 2013 trên tạp chí The Lancet.

Các tác giả nghiên cứu cho biết, tác hại nguy cơ đau tim từ thuốc NSAID tăng chủ yếu trên bệnh nhân có tiền sử bệnh tim. Những người có tiền sử bệnh tim hoặc các yếu tố nguy cơ cho bệnh tim có nguy cơ cao hơn, họ kết luận rằng, các bác sĩ nên cân nhắc trước khi kê đơn cho một liều cao thuốc NSAID cho nhóm đối tượng bệnh nhân này.

Theo kết quả phân tích mới nhất của trên hơn 353.000 bệnh nhân cho thấy rằng, cứ mỗi 1.000 bệnh nhân có nguy cơ trung bình đối với tim, có ba trường hợp có thể tránh được cơn đau tim sau khi dùng liều cao của NSAID trong một năm. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, một trong những cơn đau tim sẽ gây tử vong.

Liều cao của thuốc giảm đau thông thường có thể tăng nguy cơ biến tim

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 02 Tháng 6 2013 15:19 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 02 Tháng 6 2013 15:34



Đang tải hình ảnh. Vui lòng đợi một chút để hình ảnh được tải đầy đủ. Vui lòng đợi một chút để hình ảnh được tải đầy đủ.