

Vịt bòi Biên tảo viên

Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 11:41 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ năm, 20 Tháng 2 2020 11:47

Bs Lê Tân Thành -

Báo về cá nhân:

- Nhân viên y tế vào phòng phẫu thuật nên chú ý sử dụng “airborne precautions”.
- Đeo mặt nạ hô hấp N95, lọc được 95% các phân tử (particle) có đường kính > 0,3microns. Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua đường không khí bao gồm cho mặt (nhà kính bao hoặc tấm che mặt), áo choàng và găng tay để phòng lây truyền không giọt bắn nhả và các phân tử trong không khí như hít thở đang trên các bề mặt môi trường và các màng nh่าย. Vệ sinh tay (sử dụng dung dịch đánh tay chà a côn) là cần thiết trước và sau đeo găng tay.


Lên kế hoạch:

- Nếu có kế hoạch gây mê phẫu thuật: Trì hoãn nếu có phẫu thuật không cấp cứu cho đến khi bùn nhân đặc biệt không đụng là không lây nhiễm hô hấp không nhiễm bùn.
- Khi phẫu thuật không thể trì hoãn đặc biệt, sử dụng phẫu thuật vội vàng thiêu nhân viên y tế và sử dụng nhân có mặt tại khu phẫu thuật.
- Dành thời gian nhất có thể trước khi đón bùn nhân tiếp theo (để loại bỏ sử dụng bùn trong không khí).
- Nếu có thể, tiến hành những thủ thuật như bùn phòng.

CORANOVIRUS (2019-ncov): Khuy n cáo trong g y m  ph u thu t

V o t b i Bi n t p vi n

Th n m m, 20 Th ng 2 2020 11:41 - L n c p nh t cu i Th n, 20 Th ng 2 2020 11:47



http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/researchpaper/wcms_639138.pdf