


## **Bs Lê Thị Minh Hằng -**

### **Sở Y tế Cần Thơ**

Trong suốt thế kỷ XIX, ở châu Âu và Mỹ, 25% bà mẹ sinh con tại bệnh viện đã tử vong do sốt huyết. Sau đó nguyên nhân của những tử vong đó được tìm thấy do vi khuẩn streptococcus pyogenes. Năm 1843, bác sĩ Oliver Wendell Holmes Mỹ yêu cầu một bác sĩ khoa sản (nơi ông làm việc) nghỉ việc trong thời gian 1 tháng sau 2 trường hợp bà mẹ tử vong mà ông cho rằng liên quan đến việc sinh tay của bác sĩ đó. Ý kiến của ông bị các bác sĩ cùng thời phớt lờ. Vào những năm 1840, Bác sĩ Ignaz Semmelweis công tác tại bệnh viện đa khoa Viên (Áo) khám phá ra sự khác biệt về tỉ lệ tử vong giữa các bà mẹ sau khi sinh con giữa 2 khoa sản của bệnh viện. Năm 1846, Semmelweis nghiên cứu và thực nghiệm, tại 2 khoa sản của bệnh viện, cùng thực hành một kỹ thuật rửa tay. Khoa thực nghiệm là khoa thực hành của sinh viên Y khoa, nơi mà chỉ có Bác sĩ là sinh viên Y khoa làm việc, có tỉ lệ sốt huyết sản là 13,1%. Tỉ lệ này cao gấp 5 lần so với quy khoa thực hành là khoa hộ sinh do thực hành cho nữ hộ sinh, có tỉ lệ tử vong của các bà mẹ sau sinh là 2,03%. Ông quan sát và thực nghiệm, các bác sĩ và sinh viên y khoa thực nghiệm không rửa tay sau thăm khám bệnh nhân này và chuyển sang thăm khám bệnh nhân khác hoặc thậm chí sau khi mổ thi bệnh nhân. Ông cho rằng, nguyên nhân của sốt huyết sản là do bệnh tay chửa tác nhân gây bệnh do không rửa tay của bác sĩ và sinh viên y khoa.



Để biết thêm chi tiết xin truy cập <http://www.who.int/campaigns/hand-hygiene-day>