

Bs CKI Phạm Văn Sáu - Khoa Cấp Cứu

Vào lúc 22 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2016 Khoa Cấp cứu BVĐK tỉnh Quảng Nam tiếp nhận mô tả bệnh nhân Nguyễn T. Ch. 51 tuổi, quê ở Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam, vào viện trong tình trạng: bệnh nhân lơ mơ, kích thích, nôn mửa nhiều lần, nôn ra máu ít, tri thức hoàn, huyết áp tối thiểu: 70/40 mm/Hg, nhịp tim chậm khoảng 40 lần/phút. ECG: Block AV III. Các bác sĩ đã thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh và đề nghị người nhà cung cấp thông tin rằng trước đó bệnh nhân có uống bia nhiều, cảm thấy say nên không để ý, khi thấy tình trạng bệnh nhân nặng, vội vã kích thích để người tìm thấy trái mướp sất, khả năng bệnh nhân ăn vội ý đồ tự sát (ở vùng quê này người dân dùng bia để trị trái mướp sất rồi để khi ăn phải) nên vội vã đưa đi bệnh viện.



Bệnh nhân được làm tất cả các xét nghiệm huyết học, sinh hóa máu và siêu âm; không thấy tình trạng thiếu máu, chưa thấy biểu hiện suy gan – thận và rối loạn điện giải.

Đề nghị chẩn đoán: Người mắc trái mướp sất, khả năng có ý đồ tự sát/ Bị n ch ng: Tri thức hoàn – Block AV III, hôn mê.

Bệnh nhân được xử trí hô hấp và thở oxy, bù dịch, tiêm Atropin và chuyển khoa Hồi sức tích cực – chăm sóc đặc biệt (ICU) để điều trị tiếp. Tiền sử bệnh rõ ràng vì đến muộn hơn 6 giờ, tình trạng nghiêm trọng.

Theo dữ liệu của Lê Quân Trung bài viết “Nhện độc cây chấu da ở tỉnh Quảng Nam”- NXB Quân đội nhân dân, cây mướp sất còn có tên khác: Hổ qua tím - Tên khoa học: *Cerbera manghas* L. (*C. odollam* Gaertn) – Thuộc họ Trúc đào: Apocynaceae, cây gỗ nhỏ, mọng, cao từ 4-6m thân có vỏ

Nhân mọt trắng ngả p ngả đỏ trái mọt p sát ở BVĐK tỉnh Quảng Nam

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 03, 03 Tháng 8 2016 10:23 - Lần cập nhật cuối Thứ 03, 03 Tháng 8 2016 10:34

dày, xù xì, lá có phiến thon, bóng; gân phình mảnh, nhôu cuống dài, mọc so le, cuống hoa mọc ở đầu cành thành xim, hoa màu trắng, thơm; quả hình ch, hình trứng hay hình cầu, khi chín màu vàng hồng, chẻ hai hạt; ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5, ra quả từ tháng 6 đến tháng 8.

Mọt p sát phân bố ở vùng ven biển, các nước nhiệt đới châu Á, từ Malaysia đến Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam cây phân bố dọc bờ biển từ Nam đến Bắc, song cây tập trung nhất ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trở vào. Ở Quảng Nam cây phân bố ở các xã ven sông biển thu hoạch các huyện Thăng Bình, Núi Thành

Độc tính: Cây mọt p sát được xếp vào nhóm cây độc, vì trong hạt có chứa các chất Cerberin, Cerbevosid, nesifolin, Theretin rất độc đối với tim, có khả năng gây tử vong, loài trái độc này có thể gây chết người từ 3 – 6 giờ sau khi ăn phải, nếu ăn vào cây có tác dụng gây mê, ăn phải hạt mọt p sát có biểu hiện ngộ độc tăng dần theo thời gian, có triệu chứng xuất hiện sau khi ăn 10 – 15 phút, gồm: Buồn nôn, đau bụng, nôn ói dữ dội, tiêu chảy sau đó mất l. Các triệu chứng thần kinh gồm: mất ngủ, lơ mơ Hội chứng thủng dạ dày ruột như hội chứng nhũ nh, gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, nhịp tim chậm l, không đều, triệu chứng, tất huyết áp gây tử vong nhanh nếu không xử lý kịp thời bằng thuốc chống loạn nhịp tim như atropin, thuốc vận mạch và đặt máy thở nếu cần thiết.

Qua nghiên cứu phân nhân trên, chúng ta cần tuyệt đối không được sử dụng trái mọt p sát, nhất là trẻ em ở vùng ven sông có nhiều cây mọt p sát mọc, cần tuyệt đối các cháu không được ăn trái cây này.