

Ths Nguy n L ng Quang - Khoa N i TM

T NG QUAN

Nh i máu c tim c p là m t b nh c p tính gây t vong hàng đ u t i các n c Âu- M , c tính M có kho ng 1 tri u b nh nhân nh p vi n m i năm, và có kho ng 200.000 đ n 300.000 b nh nhân t vong hàng năm vì nh i máu c tim c p. T i Vi t Nam, s b nh nhân nh i máu c tim c p đang có xu h ng gia tăng, n u nh nh ng th p niên 80, nh i máu c tim c p là b nh ít g p thì nay tr thành ph bi n.

Trong nh ng năm g n đây vi c đi u tr b nh m ch vành nói chung và nh i máu c tim nói riêng đã có nhi u ti n b , đa đ ng h n v ph ng th c đi u tr , t đ n v ch m sóc m ch vành tích c c (CCU) v i các thi t b h tr nh bóng đ i xung đ ng m ch ch , ECMO, thông tim can thi p cho đ n ph u thu t b c c u m ch vành. Tuy nhiên, đi u tr n i khoa v n đóng vai trò n n t ng, trong đó Aspirin và Clopidogrel đ c xem là li u pháp kháng ti u c u chu n trong h i ch ng m ch vành c p và trong các th thu t can thi p m ch vành qua da đ ng n g a bi n ch ng huy t kh i trong stent. Nghiên c u CURE, nghiên c u CLARITY và nghiên c u CURRENT OASIS 7 đã xác l p vai trò c a clopidogrel trong h i ch ng vành c p. Kê t năm 2007, Tr ng môn Tim Hoa Kỳ khuy n cáo đi u tr kháng ti u c u kép aspirin ph i h p v i clopidogrel trong điều trị nh i máu c tim c p ST chênh lên / không ST chênh lên.

Cơ chế tác động khác biệt của các thuốc ức chế P2Y₁₂






Figure adapted from Schomig A (2009). CYP, cytochrome P450. Schomig A. *N Engl J Med* 2009;361:1108–1111.



Hình 1: h p LAD1 do m ng x v a và huy t kh i.




Hình 2: Huyết khối gây tắc hoàn toàn trong stent LAD1

Nhân m t tr ng h p huy t t c stent nghi do kháng clopidogrel

Vi t b i Biên t p viên

Ch nh t, 30 Tháng 4 2017 07:24 - L n c p nh t cu i Ch nh t, 30 Tháng 4 2017 07:32



Coronary angiogram image showing the left coronary artery system. The image is a grayscale X-ray showing the branching of the coronary arteries. Text overlays include patient information and technical details.