

**CN Nguy n Th Lam Tuy n - GMHS**

Đ đ m b o an toàn cho bn nhn trong cu c ph u thu t đ i gây mê ho c gây tê, bn nhn đ u b t bu c ph i đ c nhn ăn, uống ít nh t 6 ti ng tr c khi ph u thu t ch ng trnh (tr tr ng h p m c p c u không có th i gian ch đ i). Tuy nhiên, v i tâm lý: “Ăn m i có s c đ m ” ho c “ Tôi đói quá không ch u đ c...” nên th ng ăn tr c m mà không h l ng tr c đ c h u qu nghi m tr ng, m t nguy c ti m tàng trong cu c ph u thu t mà có th đ n t i t vong.





## Sơ cứu nhiễm trùng nướu răng khi bệnh nhân phàn nàn

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ ba, 23 Tháng 9 2014 16:16 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 23 Tháng 9 2014 16:29

---

phản ứng vào buổi chiều thì bệnh nhân có thể uống sau nửa đêm tới 7 giờ sáng của ngày đi mổ.

- Trẻ > 12 tuổi và người lớn:

Mức chăm sóc trong 12 giờ: Không ăn những thức ăn dính hay lỏng sau nửa đêm kể cả nhai kẹo cao su hay ăn các loại kẹo khác. Nếu uống thuốc thì phải uống với 1 ngụm nước.

Những thuốc không thể sử dụng phải đợi uống sau mổ.

Mức chăm sóc sau 12 giờ: Không ăn những thức ăn dính kể cả nước cam, sữa, kem... sau nửa đêm. Nước lọc, nước táo, nước chanh cà phê không sữa có thể uống sau nửa đêm tới 7 giờ sáng của ngày đi mổ. Nếu uống thuốc thì phải uống với 1 ngụm nước.

Những thuốc không thể sử dụng phải đợi uống sau mổ. Bệnh nhân có thể được cho thêm thuốc kháng acid trước mổ để giảm độ acid của dịch dạ dày và làm trống dạ dày trước mổ.