

Ths Nguyễn Ngọc Võ Khoa - Khoa Nhi tiêu hóa

Việc xác định và kiểm soát bệnh nhân xu hướng tiêu hóa là kỹ năng quan trọng cho các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa.

Bệnh nhân có thể bị mất máu cấp tính hoặc mạn tính. Đánh giá theo thang điểm lâm sàng có thể xác định nguy cơ tử vong do xu hướng.

Nội soi giúp đánh giá nguy cơ tái xu hướng bao gồm tổn thương đang chảy máu, loét mạch, cục máu đông, cục máu đen, hoặc loét đáy sạch.

Phân biệt XHTH cao hay thấp rất quan trọng vì XHTH thấp ít đe dọa tính mạng hơn và nội soi đường tiêu hóa có vai trò ít quan trọng hơn.


Nội soi đường tiêu hóa bao gồm thiết bị vòng cao su để với XHTH do giãn tĩnh mạch trĩ và đứt lách gan cấp, đứt nhĩ, argonplasma, kẹp clip, và tiêm epinephrine để bệnh nhân loét dạ dày tá tràng.

Ở bệnh nhân XHTH mà cần nội soi tiêu hóa trên và nội soi đường tiêu hóa không phát hiện ổ loét, viên nang nội soi, X quang và nội soi ruột non có thể giúp phát hiện tiêu điểm xu hướng.

Tìm hiểu và xu hướng tiêu hóa

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 20:03 - Liên lạc người tu sĩ Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 20:34

[illegible]