


Bs Hu nh Minh Nh t - Khoa N i Tiêu hóa

Nh ng năm g n đây nhi u ph ng ti n ch n đoán hi n đ i ra đ i tuy nhiên đ i v i b nh lý đ ng tiêu hóa trên, n i soi v n gi  m t vai trò đ c bi t quan tr ng. Bên c nh l i th  v  ch n đoán nh  nhìn th y tr c ti p t n th ng, sinh thi t làm gi i ph u b nh, tìm vi khu n *Helicobacter pylori*, xác đ nh nguyên nhân, v  trí và m c đ  ch y m u, n i soi hi n nay đang phát tri n m nh m  v  m t can thi p đ u tr  nh  c m m u c p c u, th t t nh m ch đ  phòng, l y d  v t, g p giun và đ c bi t là c t đ t niêm m c đ u tr  ung th  s m.



Nh ng ki n th c v  n i soi không ch  c n thi t cho các bác sĩ lĩnh v c N i soi, N i tiêu hóa mà

Vài nét cơ bản về nội soi đường tiêu hóa trên

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 14:22 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 15:02

còn giúp ích cho các bác sĩ lâm sàng nói chung. Không những giúp đưa ra chẩn đoán hợp lý và kịp thời mà còn định hướng kỹ thuật cho nội soi một cách đầy đủ để đó đưa ra cách xử trí đúng đắn đem lại hiệu quả ích cho bệnh nhân. Nội soi đường tiêu hóa trên là một lĩnh vực khá rộng lớn, bài viết này xin đề cập đến các nội soi nội tụy mật chủ yếu, chẩn đoán và chẩn đoán các bệnh lý thông thường gặp.

Theo Hội Nội soi Tiêu hóa của Mỹ (the American Society for Gastrointestinal Endoscopy - ASGE), nội soi tiêu hóa thông thường được chia thành:

1. Nếu có thể một số thay đổi về đường ruột đưa ra trên kỹ thuật của nội soi.
2. Sau khi thăm khám đường ruột cho chẩn đoán rõ ràng hơn tiêu hóa lành tính bệnh nhân đã không thành công.
3. Là phương pháp đánh giá ban đầu như là một thay thế cho chụp X quang.
4. Cần nhận biết một số thủ thuật đường ruột đưa ra tiên.

Nội soi tiêu hóa thông thường không được chia thành:

1. Khi kỹ thuật sẽ không đóng góp cho đường ruột.
2. Theo dõi bệnh nhân bệnh lý lành tính trước khi giám sát của một tình trạng tiến triển ung thư

Nội soi tiêu hóa thông thường chẩn đoán:

1. Khi các triệu chứng về tiêu hóa hay sự sống của bệnh nhân được đánh giá lâm sàng hiệu quả ích nhất nhất của thủ thuật.
2. Khi sự hợp tác của bệnh nhân không đủ hoặc không đồng ý.
3. Khi thông tin tiêu hóa đã bị bỏ qua hoặc nghi ngờ.

1. Chẩn đoán nội soi tiêu hóa trên

a. Nội soi chẩn đoán: tất cả các trường hợp nghi ngờ bệnh lý đường tiêu hóa trên

- Bệnh lý thực quản: nuốt vướng, nuốt nghẹn, nuốt đau...

Vài nét cơ bản về nội soi đường tiêu hóa trên

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 14:22 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 15:02

- Bệnh lý đường dày tá tràng: đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn, chán ăn, đầy bụng, khó tiêu...
- Sốt cơn, thiếu máu không rõ nguyên nhân, di căn gan, phổi.
- Triệu chứng liên quan gan mật: xơ gan, ung thư gan.
- Triệu chứng liên quan hô hấp: ho kéo dài, hít thở không rõ nguyên nhân.
- Triệu chứng liên quan đường ruột: đa polyp gia đình, viêm ruột mạn tính.
- Đánh giá tiền thủ thuật nội soi tiêu hóa trên ở bệnh nhân nuốt hóa chất.

b. Nội soi đường tiêu :

- Xuất huyết
- Lỵ đường ruột
- Hẹp thực quản
- Cột polyp
- Mổ đường qua nội soi
- Thủ thuật qua bóng Vater: lấy sỏi, lấy giun, đặt nội u mật...

2. Chỉ định và chống chỉ định

a. Tuy nhiên chỉ định:

- Ngắn ruột trở thành tình trạng tắc nghẽn đường tiêu hóa thích hợp cho nội soi
- Nghi ngờ tổn thương đường tiêu hóa

b. Tuy nhiên chống chỉ định

- Rối loạn tâm thần
- Sau phẫu thuật nội soi tiêu hóa 7-10 ngày
- Tiền sử tổn thương đường tiêu hóa mức độ do hóa chất hoặc nhiễm acid
- Đau bụng sinh lý không rõ nguyên nhân
- Viêm đường ruột cấp tính hoặc mạn tính, hô hấp
- Bệnh nhân quá già yếu
- Bệnh nhân đang có thai

Vài nét cơ bản về nội soi đường tiêu hóa trên

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 14:22 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 15:02


Một bệnh nhân có thể có chứng chỉ đường nhúng ống nội soi cân nhắc nhu cầu ưu tiên để có một quy trình thích hợp cho tình huống hoàn chỉnh. Xem xét các yếu tố sau: Ích nhận được khi soi, khả năng tại bệnh nhân xảy ra, dĩ nhiên thì bệnh nhân không soi.

3. Các bệnh lý thường gặp:

a. Viêm thực quản trào ngược

Có nhiều hệ thống phân loại trong đó bảng phân loại viêm thực quản trào ngược theo Los Angeles được dùng phổ biến nhất:

Độ A	Một hay nhiều sang thương niêm mạc < 5mm và không lan sang đỉnh của 2 nếp niêm mạc
Độ B	Một hay nhiều sang thương niêm mạc > 5mm và không lan sang đỉnh của 2 nếp niêm mạc
Độ C	Một hay nhiều sang thương niêm mạc liên tục giữa hai đỉnh của hai hay nhiều nếp niêm mạc nhưng < 75% chu vi thực quản
Độ D	Một hay nhiều sang thương niêm mạc liên tục giữa hai đỉnh của hai hay nhiều nếp niêm mạc chiếm > 75% chu vi thực quản



Độ I

Độ II

Độ III

C. Viêm dạ dày ruột (gastroenteritis) là một bệnh lý phổ biến, thường do nhiễm trùng hoặc do các yếu tố khác như stress, dị ứng, hoặc sử dụng thuốc. Triệu chứng bao gồm đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, và mất nước. Điều trị thường bao gồm nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ nhàng, và sử dụng thuốc để giảm đau và chống viêm.




1

2

3


Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 14:22 - Liên lạc với người Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 15:02



6



9



11

Model này dùng để mô tả truyền năng lượng và điện từ trong dây (size, hình d

Vài nét cơ bản về nội soi đường tiêu hóa trên


Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 14:22 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 21 Tháng 7 2016 15:02

Tính chất	Lành tính	Ác tính
Hình dạng	Tròn, bầu dục	Méo mó, không đều
Đáy	Sạch/vàng nhạt/máu đen	Bẩn, hoại tử
Bờ	Tròn, đều, phẳng	Nham nhở, gồ cao, dễ chảy máu
Nếp niêm mạc	Đến sát ổ loét	Cách xa ổ loét
Nhu động	Còn, mềm mại	Mất, giảm
Chảy máu	Ít có, từ đáy	Hay có, từ bờ

Phân loại Forrest: đánh giá nguy cơ xuất huyết (XH) bằng cách quan sát đáy ổ loét

	Đáy ổ loét	Ý nghĩa	XH tái phát
IA	Máu phun thành tia	Mới XH từ động mạch	80-90%
IB	Máu chảy thành dòng	Mới XH từ tĩnh mạch	10-30%
IIA	Mạch máu lộ	Mới xuất huyết	50-60%
IIB	Cục máu đông	Mới xuất huyết	25-35%
IIC	Cặn máu đen	Mới xuất huyết	0-8%
III	Đáy sạch	Không có nguy cơ XH	0-3%




Type 0 I: lồi

Type 0 IIa: hơi nhô


Type 0 IIb: phẳng

Type 0 IIc: hơi lõm

Type 0 III: lõm sâu



Đặc điểm của các loại polyp trong thực quản và đại tràng là có thể phát triển thành ung thư nếu không được phát hiện và loại bỏ kịp thời.



Type 1: Dạng polyp, giới hạn rõ, thường có đáy rộng.

Type 2: Loét giới hạn rõ, bờ nhô cao

Type 3: Loét giới hạn không rõ, thâm nhiễm vào mô xung quanh

Type 4: Dạng thâm nhiễm lan tỏa

Type 5: Không thuộc các dạng trên



Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

Tài liệu tham khảo: [Endoscopic Approach to the Gastrointestinal Tract, 2nd edn, 2004, by: Khoa Naisoit, BN/Vide](#)