

DS Trộn Thuốc Kỵ u Diễm

Nhiều người không uống được thuốc dạng rắn (Một số người mắc bệnh khó nuốt, người bệnh có đợt tăng xông dày không nuốt được nguyên viên thuốc hoặc trẻ nhỏ thối ng hay sợ uống thuốc vì mùi, vị khó chịu...), dạng thuốc thích hợp là các thuốc dạng lỏng như si rô thuốc, thuốc giọt, thuốc dùng ngoài đường tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải lúc nào trên thị trường nào cũng có những dạng thuốc trên, người sử dụng phải biết, phải nghiền thuốc viên và bắn khoản liều thuốc dùng như vậy có tác dụng không?



Các thuốc không được nghiền hay bẻ :

- Thuốc bao tan trong ruột, là thuốc viên không tan ở dạ dày mà chỉ tan khi đến ruột non để

Các dạng thuốc không được nghiền hay bẻ nhỏ trong quá trình đi u tr

Vị t b i Biên t p viên

Th t t , 08 Tháng 2 2017 12:32 - L n c p nh t cu i Th t t , 08 Tháng 2 2017 12:41

gi m kích ng d dày, tránh kích ng mi ng, tránh t n th ng răng và niêm m c mi ng, tránh thuốc b phá h y b i axit d ch v .

- Thuốc gi i phóng kéo dài, là d ng thuốc đ c thi t k thành nhi u l p đ thuốc đ c phóng thích t t trong c th . L p ngoài cùng s tan tr c r i đ n l p k , c th đ n ph n trung tâm c a viên thuốc là xong. Vi c b hay nghi n viên đ n đ n quá li u kh i đ u đ duy trì tác d ng mong mu n.

- Thuốc đ c: Vi c nghi n hay b thuốc khi n cho b nh nhân ho c đi u d ng hít ph i nh ng phân t khí trong su t quá trình u ng thuốc.

- Thuốc có mùi v khó ch u, th ng nhà s n xu t hay bao nh ng viên thuốc này v i đ ng đ cho m t mùi v giúp đ u ng h n. N u nghi n hay b , l p đ ng bao ngoài s m t đi đ n đ n khó khăn trong vi c u ng thuốc c a ng i b nh.

- Thuốc đ t d i l i , nhìn m t viên thuốc, r t khó phân bi t nó là thuốc c n đ t d i l i , do đó nên b o qu n thuốc trong bao bì c a chính nó. Lo i thuốc này không đ c nghi n hay b nh mà ph i gi nguyên v n đ ng m cho tan t t .

- D ng thuốc s i b t, đây là d ng thuốc khi cho vào n c, nó hòa tan nhanh chóng. Nhi u lo i viên s i, khi nghi n hay b nh , nó không còn hòa tan nhanh n a.

Ví d m t s thuốc sau nên u ng nguyên viên:

Tên thuốc	Dạng bào chế	Lý do không nghiền hay bẻ nhỏ
Aspirin PH8	Viên nén	Viên bao tan trong ruột để tránh kích ứng dạ dày
Cefuroxim	Viên nén	Thuốc rất đắng, có dạng hỗn dịch cho trẻ em.
Topamax	Viên nang	Mùi vị khó chịu

Cách s d ng thuốc viên: t t nh t là dùng n c đun sôi đ ngu i u ng c viên thuốc. Tr c khi nghi n hay b nh viên thuốc, c n h i ý ki n c a bác s đi u tr đ có h ng x lý thích h p.