

Một số đường dẫn thuốc dùng cho trẻ em

Viết bởi Biên tập viên

Chủ nhật, 30 Tháng 4 2017 07:04 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 30 Tháng 4 2017 07:07

Ds Lê Thị Diu Hiền

Trong nhi khoa việc lựa chọn và sử dụng thuốc có nhiều điểm khác biệt vì ở giai đoạn này trong cơ thể trẻ em có nhiều cơ quan chưa hoàn thiện đầy đủ về chức năng (đặc biệt là giai đoạn sơ sinh) và có nhiều biến đổi về thể chất liên tâm lý (giai đoạn dậy thì). Vì vậy việc lựa chọn một đường bào chế với một đường dùng phù hợp là một việc làm rất cần thiết khi đi mua thuốc cho trẻ em.



- Đường uống

Một số đường dẫn a thu c th ng dùng cho trẻ em

Viết bởi Biên tập viên

Chủ nhật, 30 Tháng 4 2017 07:04 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 30 Tháng 4 2017 07:07

Đây là đường dùng phổ biến nhất, đặc biệt hiện nay với hầu hết các địa điểm. Tuy nhiên với trẻ em (đặc biệt 5 tuổi), việc dùng các đường thu c viên th ng khó khăn. Nên chọn các đường thu c l ng (siro, dung dịch, hỗn hợp uống...). Những điểm mua thu c đường uống cho trẻ em, đặc biệt ở nước ta rất khó phân li u chính xác theo l a tu i. Hầu hết các chế phẩm đều là đường phân li u cho người lớn và phải bỏ hoặc cắt nhỏ khi dùng cho trẻ em. Các đường thu c để phân li u như đường dung dịch, siro... là tốt nhất. Trong trường hợp này, sẽ tham gia của đường c sĩ trong việc chọn chế phẩm và cách chia li u là rất quan trọng.

- Đường trẻ c tràng

Đây là đường dùng thu n l i cho trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ (đặc biệt 3 tuổi), nhất là trong những trường hợp sốt cao, ốm nặng (trẻ bỏ ăn, quấy khóc). Những điểm mua đường thu c để trẻ c tràng là không phải thu c nào cũng có đường bảo chế này. Hơn nữa, để uống khi bụng quặn khó khăn, đặc biệt là ở nước ta (do khí hậu nóng và trang bị bảo vệ quần áo không có mũ che nắng). Giá thành đắt, sinh khả dụng không nên dùng cũng là một vấn đề cần tránh cho đi u trẻ.

- Đường tiêm

Đường tiêm được ưu tiên cho trường hợp bệnh nặng, cấp tính và những trường hợp không dùng đường uống được (ôn mê, trẻ ru t, nôn, trẻ không chịu uống thu c...). Ưu điểm của đường dùng này là đường phân li u chính xác, sinh khả dụng bảo đảm. Những điểm mua là giá thành đi u trẻ đắt, không thể theo dõi được, đau do tiêm làm trẻ sợ.

Trong các cách tiêm, tiêm tĩnh mạch là đường dùng ưu tiên cho trẻ em. Tiêm bắp không khuyến khích vì có thể trẻ chưa phát triển đầy đủ nên sinh khả dụng có thể không nên dùng và có thể gây tổn hại cơ bắp trẻ em. Tiêm dưới da không nên theo dõi vì khó chính xác. Khi sử dụng truyền tĩnh mạch, thời gian truyền mỗi li n phải phù hợp với l a tu i và cân nặng để tránh quá tải tuần hoàn.

- Đường hô hấp qua đường khí dung

Khó khăn khi dùng cho trẻ em là chọn đường chế phù hợp. Việc phải hít đường tác dụng khi hít

Một số đường dẫn thu c thông dụng cho trẻ em

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 30 Tháng 4 2017 07:04 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 30 Tháng 4 2017 07:07

thu c không thể làm được c ở trẻ nhỏ (dưới 8 tuổi); nh ng tr ng h p này nên dùng bu ng phun. S d ng d ng phun mù luôn cần có người giúp đỡ cho trẻ, không nên để trẻ tự làm.