

Bs Nguyễn Ngọc Võ Khoa -Khoa Nhi Tiêu hóa

Bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế axit dạ dày có thể tăng nguy cơ dị ứng, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications đã đưa ra kết quả.

Chúng tôi đã quan sát thấy sự gia tăng đáng kể trong việc kê đơn thuốc làm giảm các triệu chứng dị ứng ở bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ức chế axit dạ dày. Một nhóm nào", Galateja Jordakieva, Tiến sĩ, Đại học Y Vienna, Áo, và các đồng nghiệp viết.

Do tính hiệu quả và hồ sơ an toàn có vẻ thuận lợi của họ, các bác sĩ thường kê đơn thuốc ức chế bơm proton (PPI) và bệnh nhân thường lạm dụng chúng do sợ sẽ có các loại thuốc này.

Trong số việc này, ngày càng nhiều nghiên cứu đã chứng minh các tác động phụ nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng lâu dài và lạm dụng các loại thuốc này. Chúng bao gồm tăng nguy cơ gây nhiễm trùng do vi khuẩn Clostridium difficile hoặc các bệnh nhiễm trùng tiêu hóa khác và viêm phổi.

Các nghiên cứu cũng đã đưa ra cho thấy rằng việc sử dụng các chất ức chế axit dạ dày có thể kích hoạt sự phát triển của dị ứng.

Thuốc ức chế axit dạ dày có thể làm tăng nguy cơ dị ứng

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 11 Tháng 8 2019 09:11 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 15 Tháng 8 2019 12:17



[Thuốc ức chế axit dạ dày có thể làm tăng nguy cơ dị ứng](#)