

CN Hoàng Thị Thu Minh

1. Bệnh thế nào

Căn nguyên: Salmonella typhi

Lây truyền: Qua thức phẩm, nước uống, tiếp xúc với xúc vật nhiễm bệnh, lây truyền từ người sang người qua đường phân miệng.

Thời gian ủ bệnh: 3-60 ngày, thường 7-14 ngày.

Xét nghiệm chẩn đoán

Nuôi cấy phân, máu, nước tiểu hoặc dịch tuỷ xương. Xét nghiệm Widal cho gợi ý chẩn đoán nhưng có thể gặp kết quả dương tính giả và âm tính giả, vì thế xét nghiệm này có độ tin cậy không cao.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát

Áp dụng biện pháp phòng ngừa nhìn chung là có hiệu quả. Tuy nhiên, để phòng tiếp xúc cần áp dụng để giảm thiểu các bệnh nhân đang quấy nhiễu và/hoặc tiêu chảy không thể. Trẻ em đang bị bệnh không được tiếp xúc với tiếp xúc trung đông trẻ em (nhà trẻ, trường học) cho đến khi xét nghiệm 3 mẫu liên tiếp kết quả khi ngưng đi uống kháng sinh cho kết quả âm tính để giảm thiểu S. typhi.

[Xem tiếp tại đây](#)

Kiểm soát nhiễm khuẩn đối với một số bệnh truyền nhiễm

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 30 Tháng 9 2019 23:50 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 05 Tháng 10 2019 14:30
