

Một số lưu ý khi sử dụng các thuốc hạ đường huyết đường uống

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 09 Tháng 6 2020 19:23 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 09 Tháng 6 2020 19:28

Trần Thị Kim San -

Đái tháo đường là một bệnh mãn tính. Sử dụng thuốc trong điều trị đái tháo đường là lâu dài. Thuốc điều trị đái tháo đường có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu về mức bình thường. Kiểm soát tốt lượng đường trong máu làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và huyết áp. Bên cạnh những lợi ích mang lại, thuốc có thể xảy ra một số tác dụng không mong muốn. Người bệnh cần tuân thủ chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt để giảm thiểu tác dụng không mong muốn xảy ra.

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc hạ đường huyết đường uống:

Nhóm thuốc Sulfonylurea: Glipizid, Glyburid(glibenclamid), Gliclazid, Glimepirid

- Cơ chế tác dụng: kích thích tế bào beta tiết insulin
- Ưu điểm: Đường huyết lâu có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và huyết áp
- Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là hạ đường huyết; triệu chứng tiêu hóa: đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Gliclazid là thuốc ít gây hạ đường huyết hơn so với các thuốc khác trong nhóm.
- Phòng ngừa: uống thuốc cùng bữa ăn hoặc ngay sau ăn miếng đầu tiên.



[Xem tiếp tại đây](#)