

Bs. CKII Tr□n Lâm -□

1. Nhi□m toan có kho□ng tr□ng anion tăng: dùng m□o MUDPILErS (bùn đ□t):

Ki□m tra các ch□ s□ đi□n gi□i c□a b□nh nhân, có th□ phát hi□n nhi□m toan huy□t t□□ng có kho□ng tr□ng anion tăng ([Na +] - [Cl- + HCO3-] > 16); trong tr□□ng h□p này c□n quan tâm đ□n m□t s□ ch□n đoán sau: nhi□m đ□c Methanol, tăng Ure máu, nhi□m toan ceton do ti□u đ□□ng (D KA), nhi□m đ□c
P
araldehyd, nhi□m đ□c
I
soniazid, nhi□m toan
L
actic, nhi□m đ□c
E
thylene glycol, tiêu c□ vân (
r
habdomyolysis), nhi□m đ□c
S
alicylates, ...và nhi□u lo□i khác.


increased anion gap acidosis, differential:
[Na+] - [(Cl- + HCO3-)] > ~16
Methanol
Uremia
DKA
Paraldehyde
Iron
Lactic acidosis
Ethylene glycol
rhabdomyolysis
Salicylates
MUDPILErS


normal anion gap acidosis, differential:
Spironolactone
Hyperalimentation
Acetazolamide
Addison's disease
Renal tubular acidosis
Diarrhea
Saline infusion
SHa²RDS



Xem tiếp tại đây