

Gây tê tủy sống hay gây mê toàn thân cho phẫu thuật cột sống xẹp ngùi ở người lớn tuổi?

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 19 Tháng 7 2022 10:09 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 19 Tháng 7 2022 10:16

Bs Lê Tôn Tin -

Tổng quan

Câu hỏi: Nên chọn cách gây tê tủy sống so với gây mê toàn thân lên khả năng đi lại ở người lớn tuổi phẫu thuật gãy xẹp ngùi cột sống để nghiên cứu rõ ràng?

Phương pháp: Chúng tôi đã tiến hành meta-analysis tổng hợp các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng đánh giá gây tê tủy sống so với gây mê toàn thân trên các đối tượng bệnh nhân có tuổi từ 50 tuổi trở lên đang phẫu thuật gãy xẹp ngùi cột sống tại 46 bệnh viện Hoa Kỳ và Canada. Các bệnh nhân được phân ngẫu nhiên theo tỷ lệ 1:1 để được gây tê tủy sống hoặc toàn thân. Kết quả chính là thời gian hồi phục khả năng đi lại khoảng 10 ft (3 m) một cách độc lập hoặc với khung đỡ đi hoặc gậy vào lúc 60 ngày sau khi phân loại ngẫu nhiên. Kết quả phụ bao gồm thời gian trong vòng 60 ngày, mê sảng, thời gian xuất viện và phục hồi sau 60 ngày.

Gây tê tủy sống hay gây mê toàn thân cho phẫu thuật cột sống xẹp ngùi ở người lớn tuổi?

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 19 Tháng 7 2022 10:09 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 19 Tháng 7 2022 10:16



<https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2113514> NCT02507505