

Khả năng tái đi u chỉnh trong gãy xương trẻ em (remodeling)

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bộ y, 17 Tháng 12 2022 15:54 - Lần cập nhật cuối Thủ bộ y, 17 Tháng 12 2022 16:08

Bs. Nguyễn Trung Hiếu -

Quá trình lành xương trẻ em, trải qua 3 giai đoạn:

- Giai đoạn viêm: sẽ hình thành cục máu đông và sợi fibrin
- Sụn chầy: hình thành callus, callus non-callus
- Giai đoạn tái đi u chỉnh: sắp xếp lại các cấu trúc xương.

Quá trình tái đi u chỉnh trong gãy xương trẻ em phụ thuộc nhiều yếu tố, tuy nhiên có 3 yếu tố chính: Vị trí, số di lệch, tuổi.

Yếu tố 1: Vị trí

Sụn tiếp hợp là nơi yếu nhất trong gãy xương trẻ em, tuy nhiên, có ưu điểm lớn là nơi tái đi u chỉnh gãy xương nhiều nhất trong gãy xương trẻ em

Tiếp theo là hành xương và thân xương

Khả năng tái định vị chèn ép trong gãy xương trẻ em (remodeling)

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 17 Tháng 12 2022 15:54 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 17 Tháng 12 2022 16:08



[Xem tiếp tại đây](#)