

Bs Nguy n Nh t V -

T NG QUAN

Ho i th Fournier đ c mô t chính th c l n đ u vào năm 1883 b i Jean Alfred Fournier. B nh có th do nhi u vi khu n gây ra, ti n tri n khá nhanh và đe do tính m ng c a ng i b nh, đ c tr ng b i tình tr ng ho i t vùng đáy ch u, c quan sinh d c, có th lan r ng đ n h u môn, tr c tràng, vùng đùi c a b nh nhân.

M c dù b nh t ng đ i hi m g p, tuy nhiên, b nh di n ti n khá nhanh và gây nh h ng đ n tính m ng b nh nhân, nên c n đ c ch n đoán và đ u tr tích c c s m.



M t trong nh ng t n th ng đ c tr ng c a Ho i th Fournier: B nh nhân b ho i t da, t ch c

Đãi tử da và các quan sinh dục kèm theo mùi hôi thối khó chịu. (Nguồn: Oatext.com - Fournier's gangrene: A review of contemporary management priorities)

Các nguyên nhân thường gây nên Hoại tử Fournier như:

- Nhiễm khuẩn từ đường tiết niệu
- Nhiễm khuẩn từ hậu môn, trực tràng
- Nhiễm khuẩn từ da tại chỗ, chấn thương tại chỗ

Các nguyên nhân nhiễm khuẩn ở trên thường gặp, tuy nhiên, đôi khi bệnh nhân có đái tháo đường, nghiện rượu, xơ gan, vasa sinh kém... là điều kiện cho các nhiễm khuẩn ở trên phát triển thành Hoại tử Fournier và đe dọa tính mạng bệnh nhân.

[Xem tiếp tại đây](#)