

Ths NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH - Khoa Sản

Bình quân trong số 1000 trẻ sơ sinh có khoảng từ 2-3 trẻ bị tật chân khoèo. Tật này xảy ra ở trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ. Nếu u vị trí phát hiện và điều trị đúng cách thì có thể hi vọng ngay sau sinh thì khoảng 15- 80% trẻ đang hợp có thể khỏi trong vòng từ 6 đến 8 tuần mà không cần phẫu thuật.

I. Tật bẩm sinh chân khoèo bẩm sinh là một biến dạng của cẳng 1 hoặc 2 bàn chân có mặt ngay từ khi sinh, biến dạng điển hình:

(1) Gập và nghiêng vào trong cẳng vùng gót chân.

(2) Khép và nghiêng vào trong cẳng vùng giữa bàn chân.


(3) Gập vào phía lòng bàn chân cẳng phần trước bàn chân khi nhìn vòm gan chân sâu hơn bình thường.

Biến dạng cẳng bàn chân có thể nhẹ, nặng hoặc biến dạng xương bàn chân.

Hội u bất thường ở chân khoèo bẩm sinh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 21:01 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 22 Tháng 11 2012 21:17



Hình 2: Bàn chân cong sinh lý




Hình 3: Tát chân khoèo




Hình 4: Bó bột trong chân khoèo



Hình 5: Cách xoay duỗi bàn chân trẻ sau băng thun



Hình 7: Cách tập duỗi bàn chân



Hình 8: Mang máng bàn chân sau chỉnh hình

(Tài liệu tham khảo: Tất chân khoèo bẩm sinh - Công thông tin về tất bẩm sinh – ĐHYD Huế)