

CN. Nguyễn Trần Thế Ngọc -

Sarcoptes scabiei (cái gh) là một loài ve ký sinh chui vào [da](#) và gây ra bệnh gh. Chúng đào các tìm thấy ở khắp mọi nơi, gây nên tình trạng viêm da ngứa và gây nên tình trạng ngứa ngáy khó chịu khác.

Vòng đời của *Sarcoptes scabiei*


Sarcoptes scabiei trải qua bốn giai đoạn trong vòng đời của nó: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành.

Con cái đẻ 2-3 quả trứng mỗi ngày khi chúng đào hang dưới da. Trứng có hình bầu dục và dài 0,10 đến 0,15 mm và nở sau 3 đến 4 ngày. Sau khi trứng nở, ấu trùng di chuyển lên bề mặt da và chui vào lớp sừng nguyên vẹn để xây dựng những cái hang ngắn gọn như vô hình để các gài là túi lột xác. Giai đoạn ấu trùng chui ra khỏi trứng chỉ có 3 cặp chân và tồn tại khoảng 3 đến 4 ngày. Sau khi ấu trùng lột xác, nhộng có 4 đôi chân. Đong này lột xác thành nhộng lớn hơn một chút trước khi lột xác thành con trưởng thành. ấu trùng và nhộng thường có thể được tìm thấy trong các túi lột xác hoặc trong nang lông và trong trứng từ nhộng trưởng thành, chỉ như h. Con trưởng thành là nhộng con ve không có mắt, hình túi. Con cái dài 0,30 đến 0,45 mm và rộng 0,25 đến 0,35 mm và con đực có kích thước nhỏ hơn một nửa. Giao phối xảy ra sau khi con đực đang hoạt động xâm nhập vào túi lột xác của con cái trưởng thành. Việc giao phối chỉ diễn ra một lần và khi đó con cái có khả năng sinh sản trong suốt quãng đời còn lại. Nhộng con cái rời khỏi túi lột xác và đi lang thang trên bề mặt da cho đến khi chúng tìm thấy một địa điểm thích hợp để làm hang cố định. Khi ở trên bề mặt da, chúng bám vào da bằng cách sử dụng các gai giống như móc gắn vào hai cặp chân phía trước nh. Khi con gh cái tìm thấy một vị trí thích hợp, nó bắt đầu đào hang ngoằn ngoèo để trú ẩn của mình, để trú ẩn trong quá trình này. Sau khi con cái vào da, nó vùi nó đó và tiếp tục kéo dài hang và để trứng cho đến hết đời (1-2 tháng). Trong nhộng đi vào kiết khuẩn nội nh, khoảng 10% số trứng của nó cuối cùng sẽ phát triển thành gh trưởng thành. Con đực hiếm khi được nhìn thấy; sẽ lây truyền xảy ra chủ yếu do sự lây truyền của nhộng phụ nữ đã mang thai trong quá trình tiếp xúc giữa người và người, da da. Đôi khi sự lây truyền có thể xảy ra qua các vật dụng (ví dụ: giường hoặc quần áo).

Cái ghẻ - *Sarcoptes scabiei*

Vị trí biên tập viên

Thứ hai, 26 Tháng 6 2023 21:24 -



[Xem tiếp tại đây](#)