

Võ Thị Hồng Hạnh, ThS.BS. Phạm Thị Vĩnh – Khoa HHTM

Truyền máu là liệu pháp điều trị rất hữu hiệu, truyền máu không những giúp bổ sung các thành phần máu bị thiếu hụt mà còn bổ sung thành tích tu nạp hoàn cho cơ thể, cứu sống người bệnh qua cơn nguy kịch, đem lại cho họ cuộc sống bình thường. Tuy nhiên bên cạnh những mặt lợi thì truyền máu đôi khi cũng gây ra một số tác hại nguy hiểm. Sau đây xin cập nhật một số phần có hại khi truyền máu và cách xử trí:

A. Phần liên quan truyền máu gây tan máu cấp

- Phần liên quan hiện gặp này thường hay đi kèm với tình trạng không tương hợp nhóm máu ABO và thường liên quan đến sai sót hành chính. Các triệu chứng sớm với tình trạng lơ lửng, đổ mồ hôi, nhịp nhanh và tụt huyết áp. Đau ngực, đau bụng, sốt và khó thở là các biểu hiện thường gặp. Nguy hiểm là chảy máu, suy thận, co thắt phế quản và đông máu rải rác lòng mạch (DIC).

- Hemoglobin niệu do tan hồng cầu trong lòng mạch gây nên.

- Test kháng globin trực tiếp (+) [Test Coombs trực tiếp (+)] sẽ được thực hiện sau truyền máu. Mặc dù nồng độ của phần liên quan thường có liên quan với thành tích khối hồng cầu đã truyền.

