

## Các nội dung thay đổi, bổ sung đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 11:15 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 11:18

---

### Ds Phạm Phú Trí - Khoa Dược

Công văn số 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giám sát bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam và việc cập nhật thông tin hàng ngày của sản phẩm đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành.



**Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả**

Đề nghị nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà phân phối, lưu dùng và cách dùng thuốc chứa phospholipid đậu nành, căn cứ kết luận của Hội đồng Thuốc và tác dụng y học đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế; nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

Các nội dung thay đổi/ bổ sung đối với thuốc chứa phospholipid đậu nành (Đính kèm theo công văn 757/QLD-ĐK ngày 23/01/2019 của Cục Quản lý Dược) cụ thể như sau:

[Đối với tất cả các thuốc chứa phospholipid đậu nành, thông tin trên nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng yêu cầu thay đổi nội dung các mục Chế biến, Nhà phân phối, Lưu dùng và cách dùng theo đúng các thông tin được cung cấp dưới đây]

## Các nội dung thay đổi, bổ sung đối với thuốc chứa phospholipid được nêu như sau

Vị trí bổ sung biên tập viên

Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 11:15 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 26 Tháng 1 2019 11:18

---

### 1. Chỉ định:

Cải thiện các triệu chứng bệnh lý gan như chán ăn, đau hạ sườn phải, tổn thương gan do nhiễm độc và viêm gan.

### 2. Chỉ định chỉ định:

Quá mẫn với protein được nêu như sau, được liệt kê thành phần nào của thuốc.

### 3. Liều dùng và cách dùng:

- Ngộ độc: 1800 mg/ngày chia 2 - 3 lần.
- Nên uống thuốc cùng bữa ăn.
- Không nên sử dụng thuốc này cho trẻ em dưới 18 tuổi do chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Nguồn: <http://www.dav.gov.vn/>