

Bs CKII Tr[?]n Lâm - Khoa N[?] i TM

Tr[?]ng h[?]p lâm sàng: B[?]nh nh[?]n nam, 55 tu[?]i, có các YTNC: hút thu[?]c lá, THA, ĐTĐ typ 2. Kh[?]i b[?]nh đ[?]t ng[?]t tr[?] c vào vi[?]n 2 ngày v[?]i đau đ[?]u đ[?] đ[?]i, bu[?]n nôn, nôn m[?]a. Sau 1 ngày đi[?]u tr[?] t[?]i TTYT huy[?]n B[?]c Trà My, ngày 3/8 b[?]nh nh[?]n (BN) đ[?] c chuy[?]n vi[?]n. T[?]i BVĐK Qu[?]ng Nam, BN t[?]nh, b[?]t an, đau đ[?]u nhi[?]u, HA 160/100 mmHg. K[?]t qu[?] XN lúc vào: glucose máu 11.2 mmol/L, HbA1C 7.8%, CT s[?] n[?]o: Xu[?]t huy[?]t kho[?]ng d[?]i nh[?]n, các XN khác trong gi[?]i h[?]n bình th[?]ng. BN đ[?] c đi[?]u tr[?] THA (irbesartan 300 mg/ngày), ĐTĐ (diamicrone MR 2 viên/ngày), nimodipine 360 mg/ngày, gi[?]m đau b[?]ng paracetamol... K[?]t qu[?] MSCT s[?] n[?]o (ngày 4/8): Túi ph[?]nh đ[?]ng m[?] ch n[?]o gi[?]a bên trái, kích th[?] c 5x7 mm. Ngày 7/8, BN đ[?] c ch[?]p DSA m[?] ch n[?]o, xác đ[?]nh túi ph[?]nh n[?]m [?] đ[?]n cu[?]i M1 đ[?]ng m[?] ch n[?]o gi[?]a (T). Ti[?]n hành can thi[?]p, đ[?]a microcatheter lên c[?] túi ph[?]nh, th[?] l[?]n l[?]t 7 coil; ch[?]p ki[?]m tra túi ph[?]nh b[?]t hoàn toàn. BN ra vi[?]n 10 ngày sau th[?] thu[?]t trong tình tr[?]ng t[?]nh táo, h[?]t đau đ[?]u, HA và đ[?]ng máu trong gi[?]i h[?]n bình th[?]ng.

Đây là tr[?]ng h[?]p ph[?]nh m[?] ch n[?]o v[?] đ[?] c can thi[?]p n[?] i m[?] ch l[?]n đ[?]u tiên t[?]i BVĐK Qu[?]ng Nam. Nhân thành công b[?] c đ[?]u này, chúng tôi xin trình bày tóm t[?]t Khuy[?]n cáo g[?]n đây nh[?]t c[?]a H[?]i tim m[?] ch và H[?]i đ[?]t qu[?] Hoa k[?] v[?] đi[?]u tr[?] Xu[?]t huy[?]t kho[?]ng d[?]i nh[?]n do v[?] túi ph[?]nh m[?] ch n[?]o (2012 Guideline for the Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association)


1. M[?] đ[?]u:

Ph[?]nh m[?] ch n[?]o (PMN) là do dẫn khu trú b[?]t th[?]ng c[?]a m[?]t đ[?]ng m[?] ch trong n[?]o b[?]i l[?]p áo trong c[?]a thành m[?] ch b[?] y[?]u đi. Túi ph[?]nh th[?]ng đ[?] c phát hi[?]n [?] đáy n[?]o ngay bên trong s[?], trong m[?]t vùng g[?]i là kho[?]ng d[?]i nh[?]n. Túi ph[?]nh th[?]ng có kích th[?] c khác nhau, t[?] nh[?] kho[?]ng 1/8 inch đ[?]n l[?]n g[?]n 1 inch (1 inch = 2,54 cm). Nh[?]ng túi ph[?]nh > 1 inch đ[?] c g[?]i là túi ph[?]nh kh[?]ng l[?], có nguy c[?] đ[?] c bi[?]t cao và khó đi[?]u tr[?] .


Hình 1: Ph[?]nh m[?] ch n[?]o kh[?]ng l[?]




Hình 2: Xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình




Hình 3: Minh họa đặt coil phình mạch não



Hình 4: Hình ảnh túi phình sau khi bị bít bằng coil



Hình 5: Minh họa vi phẫu kẹp túi phình chưa vỡ và đã vỡ



Surgical Clipping of a ruptured brain aneurysm: Artist depiction of a titanium microclip applied to the neck of a cerebral aneurysm excluding the aneurysm from the main arteries.