

Ths Trng Ths Kiu Loan - Khoa Vi sinh

Hút thuốc lá là một trong những vấn đề phổ biến nhất trong những nguyên nhân nhiễm HIV. CDC ước tính rằng trong năm 2009, 42% người nhiễm HIV có hút thuốc lá. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất được báo cáo.

Hút thuốc gây ra một mối nguy hiểm đặc biệt cho những người nhiễm HIV vì hai lý do sau và vượt ra ngoài những tác động tiêu cực rằng hút thuốc có hại sức khỏe của bất cứ ai. Đầu tiên, hút thuốc lá ức chế chức năng tế bào lympho CD4 + T và do đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nhất định, đặc biệt là nhiễm trùng phổi. Thứ hai, phát triển khoa học phát hiện ra sự lây nhiễm HIV đặc biệt liên kết với một tình trạng viêm mãn tính, ngay cả những người có nhiễm HIV được điều trị và cũng là tình trạng viêm này làm tăng nguy cơ biến chứng mà thuốc lá đã là một nguyên nhân. Những biến chứng bao gồm biến chứng tim mạch (như cơn đau tim và đột quỵ), biến chứng phổi tắc nghẽn mãn tính, một số khối u ác tính và gãy xương, và nhiều loại ung thư không xác định AIDS. Nói cách khác, hút thuốc gây nguy hiểm cho biến chứng nhiễm HIV.

Mối liên quan giữa HIV và hút thuốc lá

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2015 12:07 -

